

もっと安心農産物 コカブ (春どり) 栽培暦 (令和6年度)

JAちばみどり 干潟こかぶ研究会

- 土づくり
 - 完熟堆肥3トン/10aを施用する
- 施肥 ☆施肥診断にもとづく施肥量の遵守 化学肥料窒素成分使用量13kg/10a以下

	肥料名	施肥量
基肥	有機アグレット美白名人こかぶ専用(10-10-8 有機態3)	180kg/10a以下
	リンスター30	20kg/10a以下
	苦土石灰	200kg/10a以下
	けい酸加里プレミア34	100kg/10a以下

3. 防除 化学合成農薬 3成分回数まで

(スピノエース顆粒水和剤・セントリー顆粒水和剤・エスマルクDF・ジーファイン水和剤・コサイド3000は化学合成農薬に含めない)

月	管理作業	薬剤名	希釈倍数・ 処理量	使用時期	使用 回数	対象病虫害	備考
12月下旬	施肥 播種	D-D	15~200 /10a	作付の10~ 15日前迄	1回	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	
		フォース粒剤	4kg/10a (播種時)	播種時	1回	キスジノミハムシ	
1月下旬		モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	収穫21日前迄	1回	アブラムシ類 キスジノミハムシ	
		ハチハチ乳剤	2000倍	収穫7日前迄	1回	コナガ キスジノミハムシ	
		スタークル顆粒水溶剤	3000倍 2000倍	収穫3日前迄	2回	アブラムシ類 キスジノミハムシ	
4月上旬	収穫	ランマンフロアブル	2000倍	収穫3日前迄	3回	白さび病 べと病	
		アミスター20フロアブル	2000倍	収穫7日前迄	2回	白さび病 白斑病	
		アフーム乳剤	2000倍	収穫3日前迄	2回	コナガ	
		アクタラ顆粒水溶剤	3000倍	収穫前日迄	3回	アブラムシ類	
5月下旬	↓	ブロフレアSC	2000~ 4000倍	収穫前日迄	3回	コナガ キスジノミハムシ	

化学合成農薬に含めない薬剤

	スピノエース顆粒水和剤	5000倍	収穫前日迄	3回	ハモグリバエ類	
--	-------------	-------	-------	----	---------	--