

もっと安心農産物 エダマメ栽培暦 (マルチ・露地栽培)

JAIちかわ 船橋市地区もっと安心農産物生産グループ

1. 土作り

完熟堆肥を施用する。(1,500kg)

2. 施肥 土壌診断にもとづく施肥量の遵守 (化成肥料由来の窒素成分量 2.5kg/10a 以内)

|     | 肥料名            | 保証成分 (%)              | 施肥量       |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|
| 基 肥 | ①枝豆くん505       | 5-10-5<br>(有機態窒素 3.8) | 120kg/10a |
|     | ②有機アグレット673    | 6-7-3 (有機態N6.0)       | 120kg/10a |
|     | 苦土重焼燐          | 0-35-0 苦土 4.5         | 40kg/10a  |
|     | 苦土セルカ2号 (有機石灰) |                       | 60kg/10a  |
|     | ケイ酸咖喱プレミア34    | 0-0-20                | 50kg/10a  |

※基肥は、①枝豆くん505 ②有機アグレット673 のいずれかを選んで施す。

3. 防除 農薬使用成分回数は8回までです。(Zボルト-は、化学合成農薬に含まれません。)

| 月    | 管理作業 | 病害虫の発生       | 薬剤名             | 希釈倍数・処理量                                | 対象病害虫         | 備考<br>(耕種的防除の実施等)  |
|------|------|--------------|-----------------|---|---------------|--|
| 3月上旬 | 播 種  | 立枯病          | D-D (1)         | 20 <sup>リットル</sup> /10a<br>作付の10~15日前まで | ダ イ ツトセチウ     | 種子伝染性の病害は、苗床で発生するものが多いので、定植時には、健全な苗を植える。<br>(生育遅れ、子葉や初生葉に変色や奇形があるものは除く)<br><br>炭そ病やべと病が発生するところでは、Zボルト-500倍を10日おきに2回ほど散布して予防する。 |
| 中旬   |      |              | ラグビーMC粒剤 (1)    | 20kg/10a<br>播種または定植前1回                  | ダ イ ツトセチウ     |  |
| 下旬   |      |              | カルホス微粒剤F (1)    | 6kg/10a<br>播種・定植時土壌表面散布                 | ダバ I<br>ネリム   |  |
| 4月上旬 | 定 植  | ネリム          |                 |   |               |  |
| 中旬   |      |              |                 |   |               |  |
| 下旬   |      |              |                 |   |               |  |
| 5月上旬 |      |              |                 |   |               |  |
| 中旬   |      |              | アグロスリン乳剤 (1)    | 2,000倍<br>(7日前3回以内)                     | カメムシ類<br>マツカガ |  |
| 下旬   |      |              | アファーム乳剤 (1)     | 1,000倍<br>(3日前2回以内)                     | ハエヨウ          |  |
| 6月上旬 | 収 穫  | カメムシ<br>ハエヨウ | プレバソフロアブル5 (1)  | 4,000倍<br>(3日前3回以内)                     | ハエヨウ          |  |
| 中旬   |      |              | フェニックス顆粒水和剤 (1) | 2,000倍<br>(前日3回以内)                      | ハエヨウ<br>マツカガ  |  |
| 下旬   |      |              | アルバリン顆粒水溶剤 (1)  | 2,000倍<br>(7日前2回以内)                     | カメムシ類         |  |
| 7月上旬 |      |              | ダントツ水溶剤 (1)     | 2,000倍<br>(3日前3回以内)                     | カメムシ類         |  |
| 中旬   |      |              | コロマイト乳剤 (1)     | 1,500倍<br>(収穫前日2回以内)                    | ハダニ類          |  |
| 下旬   |      |              |                 |   |               |  |

☆みんなで守ろう生産基準