



ニンニクの病害虫防除対策

今後、曇雨天が続くような場合には病害が発生しやすくなりますので、事前の予防散布、病害の早期発見や防除に努めてください。なお、**薬剤の散布に際しては、収穫前日数に十分注意し、株元や葉全体に丁寧に散布することが必要です。**

病害:

- ・葉枯病
- ・黄斑病
- ・さび病
- ・白斑葉枯病
- ・春腐病

虫害:

- ・アザミウマ類
- ・アブラムシ類
- ・ネギコガ



表1 ニンニク 各種病害の主な防除薬剤

(令和6年2月15日現在)

病 害 名					薬 剤 名	希釈倍率	使用時期 / 使用回数	分類
葉枯病	黄斑病	さび病	白斑葉枯病	春腐病				
○	○	○	○		ダコニール1000	1,000倍	収穫7日前まで/6回以内	M5
○	○				ポリベリン水和剤	1,000~1,500倍	収穫3日前まで/3回以内	19とM7
○	○	○	○		オンリーワンフロアブル	1,000倍	収穫7日前まで/3回以内	3
○	○	○	○		シグナムWDG	1,500倍	収穫3日前まで/3回以内	7と11
○		○			アミスター20フロアブル	2,000倍	収穫7日前まで/3回以内	11
				○	バリダシン液剤5	800倍	収穫3日前まで/5回以内	U18
				○	カスミンボルドー	1,000倍	収穫7日前まで/5回以内	24とM1
		○	○	○	Zボルドー	500倍	- / -	M1

注) 分類欄には、FRACコードを記載しました(コードが2つは混合剤)。同一分類(コード)の連用は避けてください。

表2 ニンニク アザミウマ類、アブラムシ類、ネギコガの主な防除薬剤

(令和6年2月15日現在)

害 虫 名			薬 剤 名	希釈倍率	使用時期 / 使用回数	分類
アザミウマ類	アブラムシ類	ネギコガ				
○			スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	収穫前日まで / 3回以内	5
○			ディアナSC	2,500~5,000倍	収穫前日まで / 2回以内	5
○	○	○	ハチハチ乳剤	1,000倍	収穫7日まで / 2回以内	21A
○	○	○	モスピラン顆粒水溶剤	2,000~4,000倍	収穫前日まで / 2回以内	4A
	○	○	アディオオン乳剤	2,000~3,000倍	収穫前日まで / 2回以内	3A
	○	○	ジェイエース水溶剤	1,000倍	収穫7日前まで / 2回以内	1B

注) 表2の分類欄には、IRACコードを記載しました。同一分類(コード)の連用は避けてください。

- 農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。
- 営農 News は JA全農いばらきホームページでもご覧になれます。