

栽培防除暦(馬鈴薯生産部会)【生食・加工】

令和3年度 JA帯広大正

実施時期 (目安)	肥料名 10a施用量	病害虫名 雑草名	農薬名	希釈倍数	10a薬量 (水100L)	使用時期 (収穫前)
3/下～4/上頃		黒あざ病	モンカトフロアブル40	200倍	—	植付前
		黒あし病、そうか病	アグレプト液剤	100倍	—	植付前
4/中～4/下頃 (植付け)	農配馬鈴薯2号 100kg程度					
5/上～5/中頃		一年生雑草	ザクザ液剤	—	200ml	萌芽前処理
			(バスタ液剤)	(—)	(200ml)	(植付後萌芽直前)
6/01～6/08頃		ナストビハムシ	モスビランSL液剤	4000倍	25ml	7日前まで
6/09～6/16頃		疫病	グリーンダイセンM水和剤	500倍	200g	7日前まで
			(グリーンペンコゼブ水和剤)	(500倍)	(200g)	(7日前まで)
6/17～6/24頃		疫病	リアアブルフロアブル	800倍	125ml	7日前まで
6/25～7/02頃		疫病	ゾーベック エンカンティア	2000倍	50ml	14日前まで
		軟腐病	マテリアナ水和剤	1000倍	100g	7日前まで
		アブラムシ類	ゲットアウトWDG	3000倍	33g	7日前まで
7/03～7/10頃		疫病	プロホース顆粒水和剤	1000倍	100g	7日前まで
		軟腐病	ハイオキパー水和剤	1000倍	100g	発病前～発病初期
7/11～7/18頃		疫病	フロサイトSC	1500倍	66ml	7日前まで
		疫病、軟腐病	カスミンホルトー (カッパーション水和剤)	800倍 (800倍)	125g (125g)	7日前まで (7日前まで)
7/19～7/26頃		疫病	ホライズントライフロアブル	1500倍	66g	14日前まで
			(カピナイスPZ水和剤)	(600倍)	(166g)	(7日前まで)
		軟腐病	アグレプト液剤	1000倍	100ml	7日前まで
7/27～8/03頃		疫病	ランマンフロアブル	1500倍	66ml	7日前まで
			(ライメイフロアブル)	(2000倍)	(50ml)	(7日前まで)
		軟腐病	ハイオキパー水和剤	1000倍	100g	発病前～発病初期
8/04～8/11頃		疫病	レーバスフロアブル	1500倍	66ml	7日前まで
茎葉トップパー 処理直後		疫病	ランマンフロアブル	1500倍	66ml	7日前まで
			(ライメイフロアブル)	(2000倍)	(50ml)	(7日前まで)
		疫病、軟腐病	フントーLフロアブル (コサト3000)	500倍 (1000倍)	200ml (100g)	— (—)

施肥:農配馬鈴薯2号 N=6.0kg P=21.0kg K=11.0kg Mg=5.0kg
 茎幹防除回数:12回(種いもの消毒を含む)

栽培防除暦(馬鈴薯生産部会)【特別栽培メークイン】

令和3年度 JA帯広大正

実施時期 (目安)	肥料名 10a施用量	病害虫名 雑草名	農薬名	希釈倍数	10a薬量 (水100L)	使用時期 (収穫前)	成分 カント
3/下~4/上頃		黒あざ病	モンカットフロアブル40	200倍	—	植付前	1
		黒あし病、そうか病	アグレプト液剤	100倍	—	植付前	0
4/中~4/下頃 (植付け)	農配馬鈴薯2号 90kg						
6/01~6/10頃		ナストビ'ハムシ	モスピランSL液剤	4000倍	25ml	7日前まで	1
6/11~6/20頃		疫病	グリーンダイゼンM水和剤	500倍	200g	7日前まで	1
			(グリーンペンコセ'フ水和剤)	(500倍)	(200g)	(7日前まで)	
6/21~6/30頃		疫病	ゾーベック エンカンテイア	2000倍	50ml	14日前まで	2
		軟腐病	アグレプト液剤	1000倍	100ml	7日前まで	0
		ア'ラムシ類	グットアウトWDG	3000倍	33g	7日前まで	1
7/01~7/10頃		疫病	レーバ'スフロアブル	1500倍	66ml	7日前まで	1
		軟腐病	バイオキ'パー水和剤	1000倍	100g	発病前~ 発病初期	0
7/11~7/20頃		疫病	フロント'イトSC	1500倍	66ml	7日前まで	1
		疫病、軟腐病	カスミン'ホルト (カッパ'シン水和剤)	800倍 (800倍)	125g (125g)	7日前まで (7日前まで)	0
7/21~7/30頃		疫病	ランマン'フロアブル	1500倍	66ml	7日前まで	1
			(ライメイ'フロアブル)	(2000倍)	(50ml)	(7日前まで)	
		軟腐病	バイオキ'パー水和剤	1000倍	100g	発病前~ 発病初期	0
7/21~7/30頃		ア'ラムシ類	ウララDF	4000倍	25g	7日前まで	1
			ア'ラムシ類	ウララDF	4000倍	25g	7日前まで
茎葉'フォ'パー 処理直後		疫病、軟腐病	ア'シド'ー'フロアブル (コ'サイト'3000)	500倍 (1000倍)	200ml (100g)	— (—)	0

施肥:農配馬鈴薯2号 N=5.4kg P=18.9kg K=9.9kg Mg=4.5kg

基幹防除回数:8回(種いもの消毒を含む)

農薬成分カント:10