

主な園芸殺菌剤の分類②

令和7年5月 J A全農ちば 営農支援課

系 統 名		FRAC コード	農 薬 名	主 な 対 象 病 害	作 用 特 性				
					防除対象	予防効果	治療効果	浸透移行	耐性菌
MBC（メチルベンザイミダゾールカルバマート）剤		1	ベンレート、トップジンM(混合剤:ラビライト)	灰色かび病、菌核病	選択的	○	○	○	有
ジカルボキシイミド系		2	ロブラール、スミレックス(混合剤:スミブレンド)	灰色かび病、菌核病、つる枯病	選択的	○	○	○	有
DMI剤（EBI剤）		3	トリフミン（混合剤：パンチョTF）、ルビゲン、アンビル、ラリー、マネージ、スコア、インダー	うどんこ病、さび病	選択的	○	○	○	有
QoI剤（ストロビルリン系）		11	アミスター（混合剤：アミスターオプティ、ユニフォーム粒剤）、ストロビー、ファンタジスタ、メジャー、スクレア	灰色かび病、うどんこ病、さび病、べと病、輪紋病	汎用的	○	○	○	有
SDHI剤	アニライド系	7	カンタス（混合剤：シグナム・ナリア）、アフエット（フルーツセイバー）、ネクスター、パレード、ケンジャ、カナメ	灰色かび病、菌核病、灰色かび病、菌核病、うどんこ病、葉かび病	選択的	○	△	△	有
	ベンズアニリド系		モンカット	さび病、白絹病、立枯病(リゾクトニア)	選択的	○	△	△	有
AP剤（アニリノピリミジン系）		9	フルピカ、ユニックス	灰色かび病、うどんこ病	選択的	○	△	△	有
KRI剤（アミノピラゾリノン系）		17	ピクシオ	灰色かび病	選択的	○	△	△	無
アリルフェニルケトン系（ピロフェノール）		50	プロパティ（混合剤：ラミック）	うどんこ病	選択的	○	○	○	有
チアゾリジン系（フルチアニル）		U13	（ガッテン）（混合剤：ショウチノスケ）	うどんこ病	選択的	○	○	○	有
抗生物質		24	カスミン(混合剤:カスミンボルドー)	細菌病、軟腐病	選択的	○	○	○	有
		U18	バリダシン	苗立枯病(リゾクトニア)、白絹病	選択的	○	○	○	無
		19	ポリオキシシン	灰色かび病、うどんこ病	汎用的	○	○	○	有
PP剤（フルジオキシニル）		12	セイビアー(混合剤:ジャストミート)	灰色かび病、菌核病	選択的	○	△	×	有
カルボン酸剤（オキサリニック酸）		31	スターナ（混合剤:カセット、ナレート）	軟腐病	選択的	○	○	△	有
QosI剤（アメトクトラジン）		45	（混合剤：ザンプロDM）	べと病、疫病	選択的	○	×	×	？
OSBPI剤（オキサチアピプロリン）		49	（ゾーベック）	べと病、疫病	選択的	○	○	△	無
土壌処理剤	フルアジナム	29	フロンサイド	根こぶ病	汎用的	○	×	×	有
	フルスルファミド	36	ネビジン	根こぶ病	選択的	○	×	×	無
	イソキサゾール系	32	タチガレン	苗立枯病	選択的	○	×	○	無