

主な殺ダニ剤の特性一覧

令和4年3月 JA全農ちば営農支援部

殺ダニ剤は抵抗性がつきやすいので同じ薬剤系統を連用しない。また、多発生状況で使用すると効果が出にくいので、早めに使用する。

系統	I R A C	薬剤名	《 作用特性 》							＜ 主 な 登 録 作 物 ＞								備考	
			効果発現	殺卵力	殺幼虫力	殺成虫力	残効性	ミツバチへの影響	天敵への影響	イチゴ	スイカ	メロン	キュウリ	ナス	ピーマン	キク	バラ		梨
A	21A	ピラニカ（EW）	速	○	○	○	○	1日	大	○	○	○	○	○	—	○	○	—	かぶれ注意
		サンマイト（フロアブル）	速	○	○	○	○	3日	大	○	○	○	○	—	○	○	—	—	
		ダニトロン（フロアブル）	速	△	○	○	○	1日	大	○	○	○	○	○	○	○	○	○	かぶれ注意
B	6	コロマイト（乳）	速	◎	◎	◎	△	1日	大	親株床	○	○	○	○	○	○	—	○	ハダニ類以外の害虫防除（アザミウマ等）も兼ねる
		アグリメック（乳）	速	◎	◎	◎	○	14日	大	育苗	○	○	○	○	○	○	○	—	
C	13	コテツ（フロアブル）	速	○	○	○	△	10日	大	○	○	—	○	○	○	○	—	○	チョウ目害虫防除も兼ねる
D	10B	バロック（フロアブル）	遅	○	○	×	○	1日	大	○	○	○	○	○	—	○	○	○	
E	20B	カネマイト（フロアブル）	速	◎	◎	◎	○	1日	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	
F	20D	マイトコーネ（フロアブル）	速	○	◎	◎	○	1日	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	
G	23	ダニゲッター（フロアブル）	速	◎	◎	×	◎	1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
		モベント（フロアブル）	速	◎	◎	×	◎	1日	大	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○
H	25A	ダニサラバ（フロアブル）	速	○	○	○	○	1日	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		スターマイト（フロアブル）	速	○	○	○	○	1日	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○
I	25B	ダニコング（フロアブル）	速	○	◎	◎	◎	1日	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	
A+I	21A 25B	ダブルフェース（フロアブル）	速	○	◎	◎	◎	1日	大	○	○	○	○	○	○	○	○	○	【ダニコング と ダニトロンの混合剤】
J	33	ダニオーテ（フロアブル）	速	○	◎	◎	◎	1日	—	○	○	—	—	○	—	○	○	○	

A：ピラゾール-ピリダジノン系、B：マクロライド系、C：ピロール系、D：オキサゾリン系、E～J：新規

作用特性 → ◎：良く効く、○：効果あり、△：やや劣る、×：効果無し 登録作物 → ○：登録あり、—：登録なし

※ 農薬を使用するときは、使用基準（適用作物・希釈倍数・収穫前日数・総使用回数）を確認して下さい。