

主な殺ダニ剤の特性一覧

令和5年4月 JA全農ちば営農支援部

殺ダニ剤は抵抗性がつきやすいので同じ薬剤系統を連用しない。また、多発生状況で使用すると効果が出にくいので、早めに使用する。

系統	I R A C	薬剤名	《作用特性》							〈主な登録作物〉								備考	
			効果発現	殺卵力	殺幼虫力	殺成虫力	残効性	ミツバチへの影響	天敵への影響	イチゴ	スイカ	メロン	キュウリ	ナス	ピーマン	キク	バラ		梨
A	21A	ピラニカ (EW)	速	○	○	○	○	1日	大	○	○	○	○	○	—	○	○	—	かぶれ注意
		サンマイルト (フロアブル)	速	○	○	○	○	3日	大	○	○	○	○	—	○	○	—	—	
		ダニトロン (フロアブル)	速	△	○	○	○	1日	大	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
B	6	コロマイルト (乳)	速	◎	◎	◎	△	1日	大	親株床	○	○	○	○	○	○	—	○	ハダニ類以外の害虫防除(アザミウマ等)も兼ねる
		アグリメック (乳)	速	◎	◎	◎	○	14日	大	育苗	○	○	○	○	○	○	○	—	
C	13	コテツ (フロアブル)	速	○	○	○	△	10日	大	○	○	—	○	○	○	○	—	○	チョウ目害虫防除も兼ねる
D	10B	バロック (フロアブル)	遅	○	○	×	○	1日	大	○	○	○	○	○	—	○	○	○	
E	20B	カネマイルト (フロアブル)	速	◎	◎	◎	○	1日	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	
F	20D	マイルトコーネ (フロアブル)	速	○	◎	◎	○	1日	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	
G	23	ダニゲッター (フロアブル)	速	◎	◎	×	◎	1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
		モベント (フロアブル)	速	◎	◎	×	◎	1日	大	○	○	○	○	○	○	—	—	○	マルハナバチ使用不可
H	25A	ダニサラバ (フロアブル)	速	○	○	○	○	1日	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		スターマイルト (フロアブル)	速	○	○	○	○	1日	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	
I	25B	ダニコング (フロアブル)	速	○	◎	◎	◎	1日	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	
A+I	21A 25B	ダブルフェース (フロアブル)	速	○	◎	◎	◎	1日	大	○	○	○	○	○	○	○	○	○	【ダニコング とダニトロンの混合剤】
J	33	ダニオーテ (フロアブル)	速	○	◎	◎	◎	1日	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

A：ピラゾール-ピリダジノン系、B：マクロライド系、C：ピロール系 D：オキサゾリン系、 E～J：新規
 作用特性 → ◎：良く効く、 ○：効果あり、 △：やや劣る、 ×：効果無し 登録作物 → ○：登録あり、 —：登録なし

※ 農薬を使用するときは、使用基準（適用作物・希釈倍数・収穫前日数・総使用回数）を確認して下さい。