

様式1－3(統一栽培暦様式)

もっと安心農産物 レタス（冬どり）栽培暦（令和6年度）

JAちばみどり 海上野菜組合産直部

1. 土づくり
- ・完熟堆肥2トン／10aを施用するか、エン麦・ギニアグラス・ハブソウを輪作体系として作付けする
2. 施肥 ☆施肥診断にもとづく施肥量の遵守 **化学肥料窒素成分使用量12kg／10a以下**

|    | 肥料名                             | 施肥量         |
|----|---------------------------------|-------------|
| 基肥 | ①ちばみどり有機888(8－8－8 有機態窒素 1.2) 又は | 160kg/10a以下 |
|    | ②エコレット866(8-6-6 有機態窒素 4.1)      | 300kg/10a以下 |
|    | 苦土石灰                            | 60kg/10a    |

3. 防除 **化学合成農薬 9成分回数まで**(苗購入の場合7成分回数まで)
- (Zボルドー・ジーファイン水和剤・エスマルクDF・ゼンターリ顆粒水和剤・スピノエース顆粒水和剤は化学合成農薬に含めない)

| 月                            | 管理作業    | 病害虫の発生推移                        | 薬剤名                        | 希釈 倍数・処理量                         | 回数 | 対象病害虫             | 備考<br>(耕種的防除の実施)       |
|------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----|-------------------|------------------------|
| 9月<br>月上旬                    | は種      | (ハスモンヨトウ・オオタバコガ)<br>(アブラムシ・菌核病) |                            |                                   |    |                   | 害虫防除の為、育苗床は寒冷紗で被覆をする   |
| 中旬                           |         |                                 |                            |                                   |    |                   | アブラムシ防除の為、圃場周辺の雑草を除去する |
| 下旬                           | 定植      |                                 |                            |                                   |    |                   |                        |
| 10月<br>月上旬                   |         |                                 | Zボルドー又は<br>ジーファイン<br>水和剤   | 500～800倍                          | —  | 腐敗病               |                        |
| 中旬                           |         |                                 |                            | 1000倍<br>(収穫前日)                   | —  |                   |                        |
| 下旬                           |         |                                 |                            |                                   |    |                   | ハスモンヨトウは若齢期の内に防除を実施する  |
| 11月<br>月上旬                   | トンネル被覆  |                                 | ①アフーム乳剤                    | 1000～2000倍<br>(収穫3日前)             | 3回 | ハスモンヨトウ<br>オオタバコガ |                        |
|                              |         |                                 | ②フェニックス<br>顆粒水和剤           | 2000～4000倍<br>(収穫前日)              | 2回 |                   |                        |
|                              |         |                                 | ③プレバソン<br>フロアブル5           | 2000倍<br>(収穫前日まで)                 | 3回 | ヨトウムシ             |                        |
|                              |         |                                 | エスマルクDF                    | 1000倍<br>発生初期(但し、<br>収穫前日まで)      | —  | ヨトウムシ<br>オオタバコガ   |                        |
|                              |         |                                 | ゼンターリ<br>顆粒水和剤             | 1000～2000倍<br>発生初期(但し、<br>収穫前日まで) | —  | ヨトウムシ             |                        |
| 1000倍<br>発生初期(但し、<br>収穫前日まで) | —       |                                 |                            | オオタバコガ                            |    |                   |                        |
| 中旬                           |         |                                 | ④カンタスドライ<br>フロアブル          | 1000～1500倍<br>(収穫7日前)             | 2回 | 菌核病               | トンネル被覆前に防除を実施する        |
| 下旬                           |         |                                 | ⑤コルト顆粒<br>水和剤              | 3000～4000倍<br>(収穫前日)              | 3回 | アブラムシ類            |                        |
|                              |         |                                 | ⑥ダントツ水溶剤                   | 2000～4000倍<br>(収穫前日)              | 2回 | アブラムシ類            |                        |
|                              |         |                                 |                            | 2000倍<br>(収穫前日)                   |    | アザミウマ類<br>ナモグリバエ  |                        |
| 12月<br>月上旬                   | 収穫<br>↓ |                                 | ⑦ウララDF又は<br>モスピラン顆粒<br>水溶剤 | 2000倍<br>(収穫前日)                   | 2回 | アブラムシ類            |                        |
|                              |         |                                 |                            | 2000～4000倍<br>(収穫前日)              | 3回 | アブラムシ類<br>ナモグリバエ  |                        |
| 中旬                           |         |                                 | ⑧カスミンボルドー                  | 1000倍<br>(収穫7日前)                  | 4回 | 腐敗病               |                        |
|                              |         |                                 | ⑨ファンタジスタ<br>顆粒水和剤          | 2000～3000倍<br>(収穫3日前)             | 3回 | 菌核病<br>灰色かび病      |                        |
| 下旬                           |         |                                 |                            |                                   |    |                   |                        |

☆みんなで守ろう生産基準