

もっと安心・ちばエコ農産物 春だいこん栽培暦

JA市原市 姉崎蔬菜組合 もっと安心生産グループ

1. 土づくり

緑肥としてエン麦の播種、牛糞堆肥、濃縮堆肥などを使用し土壌診断結果に基づいた施肥設計を行う。
10aにつき牛糞 2000kg、濃縮堆肥 100kg～150kg

2. 施肥 ☆施肥診断にもとづく施肥量の遵守

	肥料名	施肥量	成分
基肥	① 根菜ペレット S938 化学 N5.3%	140kg	9-13-8 苦土 0.1 ほう素 0.3
土 壌 改 良 材	② マルチサポート1号	40～100kg	苦土 15 マンガン 0.5 ほう素 0.2 硫酸銅 0.02 硫酸亜鉛 0.05 ケイ酸 12 鉄 2
	※ レオグリーン特号	150～200kg	堆肥選択する。

※ ②は土壌診断の結果を考慮する。

3. 防除

月	管理作業	病害虫の発生 推移	薬剤名	希釈倍数 ・処理量	対象病害虫	備考 (耕種 的防除 の実施 等)	
10 月 上旬	播種 中耕 防除 収穫	アオムシ・コナガ 白さび病・亀裂褐変症 キスジノミハムシ アブラムシ	リゾレックス粉剤 (1)	40kg/10a	亀裂褐変症	※1	
中旬			ダントツ粒剤 (1)	6kg/10a	アブラムシ	※2	
下旬			フォース粒剤 (1)	9kg/10a	キスジノミハムシ		
11 月 上旬			※1 他剤としてフロンサイド粉剤 40kg/10a ※2 他剤としてユニフォーム粒剤 9kg/10a ユニフォーム粒剤使用時は成分カウントが2つになる為、散布剤の使用に注意する。				
中旬			注意点:千葉エコの成分カウントが4成分の為、使用回数に注意すること。展着剤は成分カウントなし				
下旬							
12 月 上旬							
1月							
2月			Zボルドー(0) 500 倍 白さび病				
3月			スピノエース顆粒水和剤 (0) 2500 倍～5000 倍 アオムシ・コナガ				
4月			アクタラ顆粒水溶剤 (1) 2000 倍 アブラムシ類				
5月			※3 収穫前日数を確認後、使用してください。				

☆みんなで守ろう生産基準