もっと安心農産物 ミニトマト 抑制栽培暦

1. 土づくり |完熟堆肥は必ず施用する。 JAきみつ 富津トマト部会もっと安心生産グループ R5.3改定

2. 施肥 ☆施肥診断に基づく施肥量の遵守

	肥料名	施肥量			
基肥	トマト専用S785(内有機態N3.8)	140kg以下			
	※清港685号(内有機態N2.6)	200kg以下			
	珪酸加里	20kg			
	リンスターもしくは苦土重焼燐	40kg			
	畑のカルシウム	60kg			
追肥	千葉液肥2号またはトミー液肥ブラック	60kg以下			

3. 防除

3.						
散布目安	管理作業	薬剤名	希釈倍率	対象病害虫	ワンポイントアドバイス	
		D-D剤	15~20l/10a	ネコブセンチュウ	〇高温対策の実施	
	1	または ソイリーン	20~30l	ネコブセンチュウ・青枯病	-・ハウスの被覆資材、被覆塗料の使用 」・潅水を抑えすぎないよう注意	
	施肥				72.5,42,42,42,42,43,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,	
	育苗後半	スタークル粒剤	1~2g/株	コナジラミ類・アブラムシ類	○コナジラミ類、アザミウマ類対策★ハウス出入り口・側窓にネット(0.4mm以下)★ハウス周辺の除草★黄色粘着板設置	
		または ベリマークSC潅注	25ml/400株	コナジラミ類		
中旬		ダコニール1000【予防】	1000倍	葉かび病・疫病		
	ベット作り	ネマトリンエース粒剤	15 ∼ 20kg/10a	ネコブセンチュウ		
	NONIF9	ネマキック粒剤	15 ~ 20kg∕10a	ネコブセンチュウ		
下旬	定植	ベストガード粒剤	1~2g/株	コナジラミ類・アブラムシ類		
8月上旬		ベネビアOD	2000倍	コナジラミ類	〇葉かび病予防のため、下葉かきをこま めに実施。風とおしを良くする。	
中下旬		コルト顆粒水和剤 ベルクートフロアブル【予防】	4000倍 4000倍	コナジラミ類 葉かび病	○急激な気温低下時には結露による疫病の発生があるので注意する。 【灰色カビ病対策】 ★果実に付着した花弁を取り除く	
9月上旬		トランスフォームフロアブル ペンコゼブフロアブル【予防】	1000倍 1000倍	コナジラミ類 葉かび病・疫病		
中旬		ディアナSC マッチ乳剤 トリフミン水和剤【予防・治療】	2500~5000倍 2000倍 3000倍	アザミウマ類、ハスモンヨトウ コナジラミ類 葉カビ病	★灰色カビ病になった果実はハウスへ持ち出しビニール袋に入れて密閉 ★薬剤散布は午前中に実施。夕方乾くよ	
下旬		スタークル顆粒水溶剤 ファンタジスタ顆粒水和剤【予防】	2000~3000倍 2000~3000倍	アザミウマ類・コナジラミ類 葉かび病・灰色かび病	にする 【かいよう病】	
10月上旬		アファーム乳剤	2000倍	コナジラミ類	★台風後に発生注意	
中旬		コルト顆粒水和剤 アフェットフロアブル【予防】	4000倍 2000倍	コナジラミ類 葉かび病・灰色かび病	- カスミンボルドー 1000倍	
下旬		プロポーズ顆粒水和剤【予防・治療	 1500倍	葉かび病・灰色かび病・疫病		
11月上旬		スタークル顆粒水溶剤 ゲッター水和剤【予防・治療】	2000~3000倍 1500倍	コナジラミ類 灰色かび病		
中旬						

●その他 病害虫発生状況により臨機防除に使用する薬剤

セイビアーフロアブル20【予防】	灰色かび病	1000~1500倍
ロブラール水和剤【予防・治療】	輪紋病・灰色かび病	1000~1500倍
フェスティバルC水和剤【予防・治療】	疫病	600~800倍
ガードホープ液剤	ネコブセンチュウ	4000倍/ 2l/㎡潅注
ファインセーブフロアブル	アザミウマ類	1000倍
モスピラン顆粒水溶剤	コナジラミ類・アザミウマ類	2000倍
グレーシア乳剤	コナジラミ類・アザミウマ類	2000倍
モベントフロアブル ※マルハナ導入時使用不可	アザミウマ類・アブラムシ類 コナジラミ類・トマトサビダニ	2000倍

展着剤使用時のポイント

①調合の時は着剤を先に入れてから薬剤を入れる ②入れすぎる(濃すぎる)と散布した農薬が流れ落ちてしまうの で注意

トマトがまだ小さい時、散布量が少ない時は薄い濃度で使用 ③展着剤の種類

- ●汎用的展着剤(殺菌・殺虫剤用) 植物にはじかれにくくなる効果 例:まくぴか 1000あたり10~30ml
- ●殺虫剤との相性が良い展着剤 虫につきやすくなる効果

●〈化学合成農薬に含めない薬剤〉

スピノエース顆粒水和剤	コナジラミ類・アザミウマ類	5000倍
ゼンターリ顆粒水和剤	オオタバコガ	1000倍
ボトキラー水和剤【予防】	灰色かび病	1000倍
Zボルドー【予防】	灰色かび病	400~600倍
サンクリスタル乳剤	コナジラミ類	300倍
エコピタ液剤	コナジラミ類	100倍

※印のついた肥料、農薬については新規登録の物です。

【目標】過剰は農薬使用は避けましょう! 使用できる薬剤は土壌消毒剤を含め、化学合成農薬 1作22成分回数まで!

※同成分を含む薬剤 総使用回数注意

	薬剤名	共通の成分	使用回数	
	ネマトリンエース粒剤	ホスチアゼート	定植前1回	
	ガードホープ液剤	ルス クノビート	土壌潅注1回	
殺 虫	スタークル粒剤	\$\$\/= 7 =\$\.	育苗期1回 定植時1回	
剤	スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン	2回	
	ベストガード粒剤	ニテンピラム	育苗期・定植期 どちらか1回	
	ベストガード水溶剤	—	3回	
殺 菌 剤	ダコニール1000	TPN	合わせて2回まで	
	プロポーズ顆粒水和剤	IFIN	ロ 1 / E C Z 凹 よ C	
	ペンコゼブフロアブル	マンゼブ	合わせて2回まで	