

もっと安心農産物ミニトマト防除暦（令和5年版）

令和5年3月

月	旬	作業	病害虫	薬剤名	ハチ日数	濃度・使用量	出荷前日数	対象病害虫
7月	中旬	土壌消毒 (消毒剤は1剤を選 土壌還元消毒)		D-D・テロン		15~20L/10a	作付け 10~15日前	ネコブセンチュウ・ネグサレセンチュウ
	下旬	ベット作成		ソイリーン・ダブルストッパー		30L/10a(1穴当り3ml)	定植21日前	ネコブセンチュウ・ネグサレセンチュウ・萎凋病
8月	上旬	定植		バスアミド微粒剤		200~300g/立方m		苗立枯病(リゾクニア菌)
	中旬			ブスマ		1000kg/10a		ネコブセンチュウ・ネグサレセンチュウ・萎凋病
9月	上旬		オンシツコナジラミ・タバココナジラミ ハモグリバエ・アザミウマ オオタバコガ・ヨトウムシ 斑点病	ネマトリンエース粒剤		15~20kg/10a	定植前	ネコブセンチュウ
	中旬	マルハナバチ導入		スタークル粒剤	14↑	1~2g/株(植穴処理)	定植時	アブラムシ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類
	下旬			ダコニール1000	0	1000	前日	葉かび病
				アフーム乳剤	2	2000	前日	ハモグリバエ・オオタバコガ・トマトサビダニ
10月	上旬	収穫開始	オンシツコナジラミ・タバココナジラミ ハモグリバエ・アザミウマ オオタバコガ・ヨトウムシ 斑点病	ダントツ水溶剤	15↑	2000	前日	アブラムシ類・コナジラミ類
	中旬	ホリバー		スタークル粒剤	14↑	1g/株(株元処理)	前日	アブラムシ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類
	下旬	ラノテープ		ベストガード水溶剤	10↑	1000	前日	アブラムシ類・コナジラミ類
				ベルコート水和剤	0	6000	前日	葉かび病・灰色かび病
11月	上旬		オンシツコナジラミ・タバココナジラミ ハモグリバエ・アザミウマ オオタバコガ・ヨトウムシ 斑点病	ディアナSC	1	2500~5000	前日	コナジラミ類・アザミウマ類・ハモグリバエ類・オオタバコガ
	中旬			モスピラン顆粒水溶剤	1~3	2000	前日	アブラムシ類・コナジラミ類
	下旬			マッチ乳剤	0	2000~3000	前日	ハスモンヨトウ・オオタバコガ・トマトサビダニ
				バリアード顆粒水和剤	1	4000	前日	アブラムシ類・コナジラミ類
12月	上旬		オンシツコナジラミ・タバココナジラミ ハモグリバエ・アザミウマ オオタバコガ・ヨトウムシ 斑点病	ウララDF	0	2000~4000倍	前日	コナジラミ類・アブラムシ類・ミカンキイロアザミウマ
	中旬			ランマンフロアブル	0	1000~2000	前日	疫病
	下旬			ノーモルト乳剤	1	2000	前日	コナジラミ類・ハスモンヨトウ
				ガードホープ液剤	1	4000	前日	ネコブセンチュウ・トマトサビダニ
1月	上旬		オンシツコナジラミ・タバココナジラミ ハモグリバエ・アザミウマ オオタバコガ・ヨトウムシ 斑点病	ロブラール水和剤	0	1000~1500	前日	灰色かび病・輪紋病・斑点病
	中旬			プロポーズ顆粒水和剤	0	1500	前日	疫病
	下旬			コルト顆粒水和剤	3	4000	前日	アブラムシ類・コナジラミ類
				ゲッター水和剤	0	1500	前日	灰色かび病・菌核病・葉かび病
2月	上旬		オンシツコナジラミ・タバココナジラミ ハモグリバエ・アザミウマ オオタバコガ・ヨトウムシ 斑点病	コロマイト乳剤	1	1500	前日	コナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ
	中旬			カンタスドライフロアブル	0	1000~1500	前日	灰色かび病
	下旬			ウララDF	0	2000~4000倍	前日	コナジラミ類・アブラムシ類・ミカンキイロアザミウマ
				ゲッター水和剤	0	1500	前日	灰色かび病・菌核病・葉かび病
3月	上旬		オンシツコナジラミ・タバココナジラミ ハモグリバエ・アザミウマ オオタバコガ・ヨトウムシ 斑点病	モスピラン顆粒水溶剤	1~3	2000	前日	アブラムシ類・コナジラミ類
	中旬			フェスティバルC水和剤	0	600~800	前日	疫病
	下旬	ホリバー		カンタスドライフロアブル	0	1000~1500	前日	灰色かび病
				カリグリーン	0	800	前日	うどんこ病
4月	上旬		オンシツコナジラミ・タバココナジラミ ハモグリバエ・アザミウマ オオタバコガ・ヨトウムシ 斑点病	マッチ乳剤	0	2000~3000	前日	ハスモンヨトウ・オオタバコガ・ミカンキイロアザミウマ
	中旬			ランマンフロアブル	0	1000~2000	前日	疫病
	下旬			バリアード顆粒水和剤	1	4000	前日	アブラムシ類・コナジラミ類
				ベネビアOD	1	2000~4000	前日	コナジラミ類・オオタバコガ ハモグリバエ類・アブラムシ類
5月	上旬		オンシツコナジラミ・タバココナジラミ ハモグリバエ・アザミウマ オオタバコガ・ヨトウムシ 斑点病	ノーモルト乳剤	1	2000	前日	コナジラミ類・ハスモンヨトウ
	中旬			コルト顆粒水和剤	3	4000	前日	アブラムシ類・コナジラミ類
	下旬			スタークル顆粒水溶剤	14	2000~3000	前日	アブラムシ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類
				トランスフォームフロアブル	5	1000~2000	前日	コナジラミ類・アブラムシ類・ミカンキイロアザミウマ
6月	上旬							

※注意: 化学成分使用回数が40回を超えないよう十分注意すること。

病害虫の発生状況により下記の薬剤より選択。

コナジラミ類: スタークル顆粒水溶剤(3000倍・前日・2回)、チェス顆粒水和剤(5000倍・前日・3回)

ハモグリバエ: カスケード乳剤(2000~4000倍・前日・2回)、ダントツ水溶剤(2000倍・前日・3回)、プレオフロアブル(1000倍・前日・2回)

ヨトウムシ類: エスマルクDF(1000倍・前日・制限なし)

葉かび病: トリフミン水和剤(3000倍・前日・5回【バンチョと合わせて5回】)、アフットフロアブル(2000倍・前日・3回)、ホライズンドライフロアブル(2500倍・前日・3回)
サンヨール(500倍・前日・4回)、カリグリーン(800倍・前日・1回)、トリフミンジェット(400㎡当たり50g・前日・5回)

灰色かび病: ポトキラー水和剤(ダクト内投入10~15g/10a/日・発病前~発病初期・制限なし)、トップジンM水和剤(1500~2000倍・前日・5回)
ロブラールくん煙剤(300~400㎡当たり・100g・前日・3回以内)、フルピカフロアブル(2000倍・前日・4回)

軟腐病: コサイドDF(1000倍・制限なし・制限なし)

疫病: Zボルドー(500倍・制限なし・制限なし)、ペンコゼブフロアブル(1000倍・前日・2回)

アブラムシ類: 粘着くん液剤(100倍・前日・制限なし) **ハダニ類:** マイトコーネフロアブル(1000倍・前日・1回)

アザミウマ類: コテツフロアブル(2000倍・前日・3回) ※ミカンキイロアザミウマのみ適用

※ラノテープを使用しない場合は、ホリバー(10a当り200~400枚)を必ず使用