

もっと安心農産物 冬どり 大根 栽培暦 (令和5年度)

(11~2月どり)

JAちばみどり 銚子野菜連合会

1. 土づくり

完熟堆肥2トン/10aを施用するか、輪作体系にトウモロコシ、マリーゴールドを作付けする

2. 施肥 ☆施肥診断にもとづく施肥量の遵守

	肥料名	施肥量
基肥	根菜配合 606 (6-10-6) 有機態窒素2.7	130kg/10a以下
	または エコレット 866 (8-6-6) 有機態窒素4.1	110kg/10a以下
	苦土石灰	100kg/10a目安
	または 硫マグ	40kg/10a目安
	苦土重焼燐	40kg/10a目安
	または リンスター-30	40kg/10a目安

3. 防除 ①②以外に3薬剤まで使用 (Zボルドー・エスマルクDF・スピノエース顆粒水和剤・サブリンフロアブル・クプロシールドは除く)

月	管理作業	病害虫の発生推移	薬剤名	希釈倍数・処理量	対象病害虫	備考 (耕種的防除の実施等)
8月上旬	は種	ネキリムシ —— ハイマダランメイガ・キスジノミハムシ —— ヨトウムシ・アブラムシ —— 軟腐病 —— 白さび病	D-D	20 [㍓] kg/10a	ネグサレセンチュウ	センチュウ対策としてマリーゴールド・エン麦・ハブエースを作付けする
中旬			リゾレックス粉剤	40kg/10a	亀裂褐変症(リゾグリア菌)	
下旬			ネマトリンエース粒剤	25kg/10a	ネグサレセンチュウ	
9月上旬	①フォース粒剤		9kg/10a	キスジノミハムシ		
中旬	ダイアジノン粒剤 5		6kg/10a	キスジノミハムシ タネハエ	アブラムシ等の防除のため圃場周辺の除草をする	
下旬	ハチハチ乳剤 (収穫30日前まで)		2000倍	コナガアブラムシ類 キスジノミハムシ ハイマダランメイガ	降雨が多く病害の発生が予想される場合は ユニフォーム粒剤 9kg/10a ランマンフロアブル 2000倍	
10月上旬	間引き		ダコニール 1000 (収穫45日前まで)	1000倍	白さび病 ワッカ症	コナガの発生が多い場合 ディアナSC 2500~5000倍 トルネードエースDF2000倍 プレオフロアブル 1000倍 グレーシア乳剤 2000~3000倍 カスケード乳剤 2000~4000倍 アクセルフロアブル 1000倍 (ヨトウムシ)
			②アフターム乳剤 (収穫7日前まで)	1000倍	コナガ アオムシ	
			アドマイヤーフロアブル (収穫14日前まで)	4000倍	アブラムシ類	防除回数に含めない薬剤 Zボルドー 500倍 スピノエース顆粒水和剤2500倍 エスマルクDF 1000倍 サブリンフロアブル 1000倍 クプロシールド 1000倍
中旬	収穫					
下旬						
11月上旬		カスミンボルドー (収穫14日前まで)	1000倍	軟腐病 黒斑細菌病		

☆みんなで守ろう生産基準