

もっと安心農産物 初夏どり 大根 栽培暦 (令和5年度)

(5月どり)

JAちばみどり 銚子野菜連合会

1. 土づくり

完熟堆肥2トン/10aを施用するか、輪作体系にトウモロコシ、マリーゴールドを作付けする

2. 施肥 ☆施肥診断にもとづく施肥量の遵守

	肥料名	施肥量
基肥	根菜配合 606 (6-10-6) 有機態窒素2.7	140kg/10a以下
	または エコレット866(8-6-6) 有機態窒素4.1	120kg/10a以下
	苦土石灰	100kg/10a
	または 硫マグ	40kg/10a
	苦土重焼燐	40kg/10a
	または リンスター30	40kg/10a

3. 防除 ① ② 以外に4薬剤まで使用(Zボルドー・エスマルクDF・スピノエース顆粒水和剤・サブリナフロアブル・クプロシールドは除く)

月	管理作業	病害虫の発生推移	薬剤名	希釈倍数・処理量	対象病害虫	備考(耕種的防除の実施等)
2月上旬	は種 間引き ↓	ネキリムシ —— コナガ・キスジノミハムシ —— 白さび病 —— ハモグリバエ・アブラムシ	D-D	20 ^{リットル} /10a	ネグサレセンチュウ	センチュウ対策としてマリーゴールド・エン麦・ハブエースを作付けする
中旬			リゾレックス粉剤	40kg/10a	亀裂褐変症(リゾネア菌)	
下旬			①フォース粒剤	9kg/10a	キスジノミハムシ	
3月上旬			ネマトリンエース粒剤	25kg/10a	ネグサレセンチュウ	
中旬			ダイアジノン粒剤5	6kg/10a	キスジノミハムシ タネバエ	アブラムシ等の防除のため圃場周辺の除草をする
下旬			ハチハチ乳剤(収穫30日前まで)	2000倍	コナガ アブラムシ類 キスジノミハムシ ハイマダラノミガ	降雨が多く病害の発生が予想される場合は ユニフォーム粒剤 9kg/10a ランマンフロアブル 2000倍
4月上旬			ダコニール 1000(収穫45日前まで)	1000倍	白さび病 ワッカ症	
			カスミンボルドー(収穫14日前まで)	1000倍	ワッカ症 黒斑細菌病	コナガの発生が多い場合 ディアナSC 2500~5000倍 トルネードエースDF2000倍 プレオフロアブル 1000倍 グレーシア乳剤2000~3000倍 カスケード乳剤2000~4000倍 アクセルフロアブル 1000倍 (ヨトウムシ)
			②アファーム乳剤(収穫7日前まで)	1000倍	コナガ アオムシ	防除回数に含めない薬剤 Zボルドー 500倍
中旬			アトマイヤーフロアブル(収穫14日前まで)	4000倍	アブラムシ類	スピノエース顆粒水和剤2500倍 エスマルクDF 1000倍
5月上旬	サブリナフロアブル 1000倍			サブリナフロアブル 1000倍		
中旬	クプロシールド 1000倍			クプロシールド 1000倍		

☆みんなで守ろう生産基準