

もっと安心農産物(エコ認証) 初夏どり だいこん 栽培暦(令和5年度)

JAちばみどり 飯岡野菜部会

1. 土づくり

輪作体系にマリーゴールド・エン麦・ハブエース・こぶ減り大根を作付けする。

2. 施肥 ☆施肥診断に基づく施肥量の遵守

(化学肥料窒素成分使用量5.0kgまで)

		肥料名	10aの施肥量
基肥		根菜配合(6-10-6)有機態窒素2.7	140kg/10a以下
		NKマイルド028(10-2-8)有機態窒素5.3 ※磷酸過剰圃場用	100kg/10a以下
		エコレット866(8-6-6)有機態窒素4.1	120kg/10a以下
窒素成分に カウントしない肥料		苦土石灰(粒)	土壌分析により 施肥量を加減する
		苦土重焼燐	
		けい酸加里特号	
		マルチサポート1号	

3. 防除

☆農薬使用成分回数は、6成分回数までに抑える。

☆防除暦の下部に記載されている変更可能な農薬と防除農薬は選択可能とする。

☆化学合成農薬に含まれない農薬は、成分回数にカウントしないが、農薬登録は厳守する。

月	旬	作業	病害虫発生時期	薬剤名	濃度・使用量	対象病害虫	備考 (耕種的防除実施等)	
							線虫対策としてマリーゴールド、エン麦、ハブエースを作付けする	
2	上旬	播種		①フォース粒剤	6~9kg/10a	キスジノミハムシ	播種時 (全面土壌混和)	
	中旬						アブラムシ等の防除のため 圃場周辺の除草をする	
	下旬							
3	上旬	間引き	軟腐病 ヨトウムシ ハイマダラノメイガ・アブラムシ類	②ハチハチ乳剤	2000倍	アオムシ、アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ、コナガ、ダイコンハムシ、ナモグリバエ、ハイマダラノメイガ	収穫30日前	1回
	中旬			③フェニックス顆粒水和剤	2000~4000倍	コナガ、ハイマダラノメイガ	収穫7日前	
	下旬			④カスミンボルドー	1000倍	黒斑細菌病、軟腐病、ワッカ症	収穫14日前	
4	上旬		コナガ・アオムシ	⑤ランマンフロアブル	2000倍	白さび病、ワッカ症	収穫3日前	
	中旬			⑥アフアーム乳剤	1000~2000倍	コナガ、アオムシ	収穫7日前	
	下旬							
5	上旬	収穫 ↓		☆変更可能な農薬 ※上記農薬と変更可能				
	中旬			D-D	15~20kg/10a	ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ	作付10~15日前	
	下旬			ビーラム粒剤	20kg/10a	ネグサレセンチュウ、ネコブセンチュウ	播種前	全面土壌混和
6	上旬			フロンスайд粉剤	30~40kg/10a	亀裂褐変症(リゾクトニア菌)	播種前	全面土壌混和
	中旬			ブリロッソ粒剤オメガ	6kg/10a	アオムシ、アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ、コナガ、ナモグリバエ、ハイマダラノメイガ	播種時	播溝土壌混和
	下旬			ディアナSC	2500倍~5000倍	アオムシ、ウツバノミ、カブラハバチ、コナガ、ハイマダラノメイガ、ハモグリバエ類、ヨトウムシ	収穫前日	2回
6	中旬			アドマイヤーフロアブル	4000倍	アブラムシ類	収穫14日前	
				ウララDF	2000倍	アブラムシ類	収穫前日	2回
				トランスフォームフロアブル	2000倍	アブラムシ類	収穫前日	3回以内
				プロフレアSC	2000~4000倍	アオムシ、カブラハバチ、キスジノミハムシ、コナガ、ダイコンハムシ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ	収穫前日	3回以内
				グレースシア乳剤	2000~3000倍	アオムシ、カブラハバチ、キスジノミハムシ、コナガ、ハイマダラノメイガ	収穫7日前	2回
				プレバンスフロアブル5	2000倍	アオムシ、カブラハバチ、コナガ、ハイマダラノメイガ、ハモグリバエ類、ヨトウムシ	収穫前日	
				アミスター2070アブル	2000倍	白さび病、ワッカ症	収穫14日前	3回以内
				ユニフォーム粒剤	6~9kg/10a	白さび病	播種前	全面土壌混和 ※2成分カウント剤
				ネマトリンエース粒剤	20kg/10a	ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ	播種前	全面土壌混和
				ラウンドアップマックスロード	200~500ml/10a	一年生雑草	収穫5日前 (雑草生育期は畦間処理)	2回以内
☆化学合成農薬に含まれない農薬								
				スピノエース顆粒水和剤	2500~5000倍	アオムシ、コナガ	収穫7日前	3回以内
				ゼンターリ顆粒水和剤	1000倍	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、シロイチモシヨトウ	収穫前日	発生初期
				エスマルクDF	1000倍	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、オオタバコガ	収穫前日	発生初期
				ジーファイン水和剤	1000倍	うどんこ病、軟腐病、白さび病	収穫前日	予防
				コサイド3000	1000倍	白さび病	-	予防
					2000倍 (野菜類登録)	褐斑細菌病、黒腐病、軟腐病、斑点細菌病		
				Zボルドー	500倍	白さび病、褐斑細菌病、黒腐病、黒斑細菌病、軟腐病、斑点細菌病、べと病	-	予防

※プロフレアSCとグレースシア乳剤は同系統剤のためどちらか選択