

もっと安心農産物 スイカ(ハウス)栽培暦(令和7年)

JA富里市 西瓜部

1. 土づくり

作付前に堆肥を施用する

2. 施肥 ☆施肥診断に基づく施肥量の遵守

	肥 料 名	施 肥 量
基肥	有機入りペレット652 6-5-2	200kg/10a
	＜土壌改良資材＞ セルカ(有機石灰)・苦土石灰・畑のカルシウム 硫マグ・苦土重焼燐・BM ようりん・硫加・ 土づくり12号	土壌診断結果により必要量を施用

3. 防除 化学合成農薬 8 カウント(成分×回数)まで (苗購入の場合 6 カウントまで)

月	管理 作業	病 害 虫 の 発 生 推 移	薬 剤 名	グル ープ	希釈倍数 ・処理量 (収穫前日数)	対象病害虫	備 考 (耕種的防除の実施等)
12月	は種	センチュウ 立枯病	D-D	I8A	15~20L/10a (作付 10~15 日前)	ネコブセンチュウ	アブラムシ・ハダニ防除の ためハウス内および 周辺の除草を実施す る
1月	施肥		または ネマトリンエース粒剤	I1B	15~20kg/10a (定植前)	ネコブセンチュウ	
2月	定植		スタークル粒剤	I4A	2g/株 (定植時)	ワタアブラムシ	苗床ですらしを実施 し、ガッチリとした苗づ くりをする
3月	交配	アブラムシ・ハダニ うどんこ病 菌核病 うどんこ病 うどんこ病	ベルコート水和剤/ フロアブル	FM7	1000 倍 (前日まで)	菌核病 つる枯病 うどんこ病 炭疽病	換気を実施しハウス 内の湿度を下げて病 害の発生をおさえる
			パロックフロアブル	I10B	2000 倍 (前日まで)	ハダニ類	
			ウララDF	I29	2000~4000 倍 (前日まで)	アブラムシ類	
4月	収穫		カンタストライフロアブル	F7	1000~1500 倍 (前日まで)	菌核病	うどんこ病はまん延し てからでは遅いので早 めに防除を行う



同じ数字・文字は、同じグループです。農薬のローテーションは、異なるグループで行ってください。

★使用する前に必ず農薬のラベルで使用基準・注意事項を確認して下さい。

★デュアルサイド水和剤は、1カウントとなりますのでご注意下さい。

☆変更可能な農薬 （上記の表の農薬と変更して、認証基準を超えない範囲で使用可能）

薬 剤 名	グループ	希釈倍数・処理量	対象病害虫	使用時期 (収穫前)
ドクロール	I8B	1 穴当り 2～3ml	つる割病、センチュウ類 他	
ソイリン (2 成分)	I8A+I8B	1 穴当たり 2～3ml	つる割病、センチュウ類 他	植付の 10～ 15 日前まで
オーソサイド水和剤 80	FM4	800 倍	苗立枯病	播種後2～3葉 期まで
		600 倍	つる枯病、べと病	14 日前まで
ネマキック粒剤	I1B	15～20 kg/10a	ネコブセンチュウ	定植前
ロディーくん煙顆粒	I3A	100 立方m当り 20g	ハダニ類	前日まで
マイトコーネフロアブル	I20D	1000 倍	ハダニ類	前日まで
ダニサラバフロアブル	I25A	1000 倍	ハダニ類	前日まで
モベントフロアブル	I23	2000 倍	アブラムシ類、ハダニ類、アザミウマ類	前日まで
ロディー乳剤	I3A	1000～2000 倍	アブラムシ類、ハダニ類	前日まで
モスビラン顆粒水溶剤	I4A	2000～4000 倍	アブラムシ類、アザミウマ類	3 日前まで
アフーム乳剤	I6	1000～2000 倍	アザミウマ類、コナジラミ類(2000 倍)	前日まで
アグリメック	I6	500～1000 倍	アザミウマ類、ハダニ類	前日まで
チェス顆粒水和剤	I9B	5000 倍	アブラムシ類	3 日前まで
コルト顆粒水和剤	I9B	4000 倍	アブラムシ類、コナジラミ類	前日まで
フェニックス顆粒水和剤	I28	2000～4000 倍	ウリノメイガ オオタバコガ ハスモンヨトウ	前日まで
デュアルサイド水和剤	IUNE +F19	2000 倍	ハダニ類、アザミウマ類 うどんこ病	3 日前まで
スミレックスくん煙顆粒	F2	100 立方m当り 6g	菌核病	7 日前まで
スミレックス水和剤	F2	1000～2000 倍	菌核病 ※つる枯病(1000 倍)	7 日前まで
ロブラルくん煙剤	F2	300～400 立方m当り 100g	菌核病	前日まで
ロブラル水和剤	F2	1000 倍	つる枯病、菌核病	前日まで
ダコニール 1000	FM5	700～1000 倍	つる枯病、炭疽病	3 日前まで
プロパティフロアブル	F50	3000～4000 倍	うどんこ病	前日まで
ショウチノスケフロアブル(2 成分)	FU13 +F9	2000 倍	うどんこ病	前日まで
トリフィン水和剤	F3	3000～5000 倍	うどんこ病	前日まで
パンチョ TF 顆粒水和剤 (2 成分) ※トリフィン水和剤の成分含 む。総使用回数注意	FU6+ F3	2000 倍	うどんこ病	前日まで
シグナム WDG(2 成分) ※カンタストライフロアブルの成分 含む。総使用回数注意	F11+ F7	1500～2000 倍	うどんこ病、つる枯病、炭疽病	前日まで
ストロビーフロアブル	F11	2000～3000 倍	うどんこ病、つる枯病、炭疽病	前日まで
アミスター 20 フロアブル	F11	2000 倍	つる枯病、炭疽病	前日まで
カスミホルトー	F24+ FM1	1000 倍	うどんこ病、褐斑細菌病	前日まで

☆ちばエコ農業で化学合成農薬に含めない農薬(0カウント)

薬 剤 名	グループ	希釈倍数・処理量	対象病害虫	使用時期 (収穫前)	薬 剤 名
コロイト乳剤	I6	1000 倍	ハダニ類	7 日前まで	2 回以内
スピノース顆粒水和剤	I5	5000 倍	アザミウマ類	前日まで	2 回以内
カリグリーン	FNC	800～1000 倍	うどんこ病	前日まで	—
イオウフロアブル	IUM FM2	500 倍	うどんこ病	—	—