

月 旬	9	10	11	12	1	2	3	4			5			6			7			8			9											
								上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下									
生 育 ス テ ー ジ	「 水稻 （移植）」 播種期田植え分げつ期最高分げつ期幼穂形成期出穂期登熟期成熟期																																	
管 理 作 業	● 堆肥 の 施 用	● 深 耕			● 耕 う ん		● 塩 水 選 ・ 種 子 消 毒	● 播 種	● 畦 畔 作 り		● 基 肥 施 用	● 代 か き	● 箱 施 薬 剤 散 布	● 田 植 え （ 基 肥 施 用 ）		● 除 草 剤 散 布			● 中 耕 ・ 草 取 り	● 畦 畔 管 理			● 穂 肥 施 用	● 畦 畔 管 理		● 斑 点 米 カ メ ム シ 類	い も ち 病 防 除		● ヒ エ 抜 き	● 畦 畔 管 理		● 収 穫 ・ 乾 燥 ・ 調 製		● 稲 わ ら の 鋤 き 込 み
水 管 理	【深 水】 【浅 水】 【中 干 し】 【間断かんがい】 【湛水管理】 【間断かんがい】 【落 水】																																	
栽 培 の ポ イ ン ト	1. 土づくり ・ 有機物の補給として、稲わらの鋤き込みを行う。 ・ 堆肥等の施用を積極的にを行い、地力維持に努める。 ・ マルチコート2号を10a当り1～2袋（基肥または追肥）施用。 2. 作土層の拡大 ・ 深さ15cmを目標とした耕耘を行い、根域を拡大する。 3. 基 肥 ・ マイルドユーキ030を30～40kgを目安に施用する。 ・ 側条施肥田植機にも対応可能。 ・ 基肥一発肥料の場合は、マイルドコート200号を40~50kg 又は、シリカユーキ1発を30～40kg、 新マトリックス有機356を40～50kg施用する。 ・ ペースト肥料の場合は、フレーバーペーストを50kg施用する。 4. 穂 肥 ・ NKマイルド028を 出穂前20日を目安に（幼穂長0.5～1cm）施用する。 ・ 施用量は、10～20kgを目安に施用する。 ・ 施用遅れは、粗タンパク質含有率を上げ、食味に影響をおよぼすので注意する。 （化学チッソ量4.5kg以下） 5. 育 苗 ・ 種子消毒は、温湯消毒で行うか、微生物農薬エコホープDJ 又は、テクリードCフロアブルの200倍24時間浸漬で行う。 （陰干しは、しない！） ・ 播種量は、催芽粃で120～150g／箱の薄播きとする。 ・ ハウス内の温度管理とかん水量に注意し、健苗育成に努める。特に30℃以上の高温に注意する。 6. 田植え ・ 育苗日数は20～25日とし、2～2.5葉期で移植する。（徒長苗に注意！） ・ 移植時に初期害虫防除、スクミリンゴガイの食害防止を目的に、 パダン粒剤4を箱あたり60～100g使用する。 ・ 1株当り3～5本、栽植密度は㎡当り18.5株 密植に注意する。（坪60株植え） 7. 雑草防除 ・ 秋冬期の耕うんを行い、雑草の発生量の抑制に努める。 ・ 生育中の畦畔管理は、草刈り機又は、バスタ液剤（2回迄）、 ザクサ液剤（2回迄）、ラウンドアップ（3回迄）を散布する ・ 除草剤散布については、一発処理剤のプライオリティを 田植後30日迄に散布する。 ・ 雑草の発生が多い場合は、手取り又は中耕を行う。 ・ 藻類の発生が多い場合は、モゲトン粒剤を散布する。 8. 病虫害防除 ・ 畦畔及び農道などの雑草は、病虫害の発生に影響するので、草刈りを行い水田周辺の環境保全に努める。 ・ 本田後期の病虫害防除は、無人ヘリ・地上防除で対応する。 （アミスターエイト・キラップ【粒剤・フロアブル剤】） ・ スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）の防除については、 スクミンベイト3を発生時に散布する。 ・ 稲こうじ病については、ドイツボルドーAを出穂 10日前迄に散布する。（薬害注意！） 9. 水管理 ・ 田植え初期は深水、活着後は浅水で管理し分げつを促進する。 ・ 有効茎数確保後（1株当り18本前後）、中干しに入り 無効茎数と下位節間の伸長を抑制する。 ・ 落水時期は、出穂後25日以降とする。 10. 収穫・乾燥・調製 ・ 収穫は、帯緑色もみ歩合15%を目安に適期に行う。 ・ 乾燥は、水分14.5～15%とし、過乾燥に注意する。 ・ 調製は、グレーダーの網目は1.8mm以上で選別する。																																	

※使用量は、10a当たり。

※●マイルドユーキ030(10-13-10) 有機態チッソ5.3%、無機態チッソ4.7% ●マイルドコート200号(12-10-10) 有機態チッソ6.1%、無機態チッソ5.9%
●シリカユーキ1発(15-8-8) 有機態チッソ3.8%、無機態チッソ1.2% ●**フレーバーペースト(7-3-4) 有機態チッソ3.5%、無機態チッソ3.5%**
●NKマイルド028(10-2-8) 有機態チッソ5.3%、無機態チッソ4.7% ●新マトリックス有機356(13-5-6) 有機態6.6%、無機態6.4%