1	様式1-	-კ	<u>もっと女小</u>	ンビ	性物	<u>J · 1</u>	甲酮	<u> = -</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>10平极)</u>				2024
上旬 上旬 フレーナーフ フレーナー フレーナーフ フレーナー フレ	月	旬	作業								薬剤名		ハチ日数	濃度·使用量	出荷前日 数	対象病害虫
上旬 上旬 上旬 上旬 アラル・アーフ アンスフォーン 1 1000 100			播種•育苗								DーD・テロン			15~20l/10a	作付け10	ネコフ゛センチュウ・ネク゛サレセンチュウ
上旬 上旬 上旬 上旬 アフェーファブル 1 1000 10			上棒:出主 / 出								ソイリーン・ダブルスト	トッパー		30L/10a(1穴当り3ml)		
1		F 句	毒剤は1剤を								クロールピクリン・クロ	コピクフロー	-			
大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大			迭扒)								バスアミド微粒剤			200~300g/立方m	定植21日前	苗立枯病(リゾクトニア菌)
中旬 走越 アプラムシ版・コナジラミ類・ハモグリバエ類 7アプーム乳剤 2 2000 前日 アプラムシ版・コナジラミ類・ハモグリバエ対 アプラムシ版・コナジラミ類・ハモグリバエ 7アプーム乳剤 2 2000 前日 アプラムシ版・コナジラミ類・アザミウマ アプラムシ 7アプーム乳剤 1 1000 7日前 東かび病・疫病・灰色かび病 アプラムシ類・コナジラミ類・ハモグリバエ 7アプーム乳剤 1 1000 7日前 東かび病・疫病・灰色かび病 1 トランスフォームフロアブル 1 1000 7日前 東かび病・疫病・灰色かび病 1 トランスフォームフロアブル 0 1000~2000 前日 アプラムシ類・コナジラミ類・ハモグリバエ 7アプール・ハート・水和剤 1 1000 7日前 東かび病・灰色がび病 1 アプラムシ類・コナジラミ類 1 1000 7日前 東かび病・疾病・灰色がび病 1 1000 7日前 東かび病・灰色がび病 1 1000 7日前 東かび病・灰色がび病 1 1000 7日前 東かび病・灰色がび病 1 1000 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5月		土壌還元消毒								 フスマ			1000kg∕10a		ネコブ・センチュウ・ネク・サレセンチュウ・萎凋病
下旬			ベット作成								ネマキック粒剤		10	15 ~ 20kg/10a	定植前	ネコブセンチュウ
下旬		中旬	定植								アルバリン粒剤		10	2g/株(植穴処理)	定植時	アブラムシ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類
上旬 マルハナバテ海 10 1000 前日 アラムシ類・コナジラミ類・アサミママ類 アラスシ類・コナジラミ類・アサミママ類 アラムシ類・コナジラミ類・アサミママ類 アラムシ類・コナジラミ類 アラムシ類・コナジラミ類 アラムシ類・コナジラミ類 アラムシ類・コナジラミ類 アラムシ類・コナジラミ類 アラムシ類・コナジラミ類 アラムシ類・コナジラミ類 アラス・フェアブル 1000~2000 前日 アブラムシ類・コナジラミ類 アフェットフロアブル 1000~2000 前日 アグラング・スモンヨトウ アグラング・スモンコトウ アグラング・スモンコトウ アグラング・スード・スード・スード・スード・スード・スード・スード・スード・スード・スード	Ī	T 5									アファーム乳剤		2	2000	前日	ハモグリバエ・オオタバコガ・トマトサビダニ
中旬 人		卜旬									ベストガード水溶剤		10	1000	前日	アブラムシ類・コナジラミ類・アザミウマ類
下旬 収穫開始 オンショー 「ランスフォームフロアブル 5 2000 前日 アブラムシ類・コナンラミ類 オリバー アファーケーブ 下旬 ラノーテーブ 下旬 アファーケーブ 「下旬 アブラムシ類・コナンラミ類 アファーケーブ 「下旬 アリバー アリバー アファーケーブ 「下旬 アリバー アリアリバー アリアリアル アリアリアル アリアリアル アリアリアル アリアル アリアル		上旬	マルハナバチ導								アミスターオプティフロ	コアブル	1	1000	7日前	葉かび病・疫病・灰色かび病
下旬 収穫開始	о П	中旬	入								ランマンフロアブル	i	0	1000~2000	前日	· 疫病
上旬 ホリバー カリバー	6月		リロゴギ目目も人	1							トランスフォームフロ	アブル	5	2000	前日	アブラムシ類・コナジラミ類
上旬 ホリバー カリー・		下旬	以 穫開始	オ							サフオイル乳剤		0	300	前日	コナジラミ類、ハダニ類
7月 中旬 ラノーテーブ アザミウス県・ハモグリバエ類・ハスモンヨトウ 皮病 ドライン・フィクー 顆粒水和剤 0 2000 前日 皮病 の コナジラミ類・ハモグリバエ類・ハスモンヨトウ アンジャフロアブル 0 1500 前日 フナジラミ類・ハモグリバエ類・ハモグリバエ類・ハモグリバエ類・ハモグリバエ類・ハモグリバエ類・ハモグリバエ類・ハモグリバエ類・ハモグリバエ類・ハモグリバエ対 アンタジスタ類粒水和剤 1 2000~3000 前日 東かび病・反色がび病・ラどんこ病・薬がび病 アニキ乳剤 1 1000~2000 前日 アブラムシ類・ハモグリバエ・オオタバコガ・コナジラミ類 ペルクート水和剤 0 6000 前日 東かび病・灰色がび病 ウララDF 1 4000 前日 アブラムシ類・コナジラミ類 ボライズンドライロアブル 1 1500 前日 東かび病・反色がび病・分とが見 ウララDF 1 4000 前日 アブラムシ類・コナジラミ類 ボライズンドライロアブル 1 1500 前日 東かび病・灰色がび病・交前 サンオイル乳剤 0 300 前日 オオタバコガ・ハスモンヨトウ サンオイル乳剤 0 300 前日 アブラムシ 類・コナジ 三類・ハギープリバエ・ヨトウムシ・コナジラミ類 ※カリグリーン 0 800 前日 アンジ・ファ乳剤 アン・ファ乳剤 1 1000 前日 アンジ・ファッス 類 ※カリグリーン 0 800 前日 アンジ・ファ乳剤 ※カリグリーン 1 1000 前日 アンジ・ファ乳剤 ※カリグリーン 1 1000 前日 アンジ・ファ乳剤 ※カリグリーン マイトコーネフロアブル 1 1000 前日 アンジ・ファ乳剤 ※カリグリーン マイトコーネフロアブル 1 1000 前日 アンジ・ファッス 類・ハギープリバエ類・トマトサビダニ コロマイト乳剤 1 1500 前日 アンジ・ファッス 類・ハギープリバエ類・トマトサビダニ コロマイト乳剤 1 1500 前日 アンジ・ファッス 類・ハギープリバエ類・トマトサビダニ コロマイト乳剤 1 1500 前日 アンジ・ファッス 類・ハギープレ・ファーリン・ファッス 前日 アンジ・ファッス 類・ハギープリバエ類・トマトサビダニ コロマイト乳剤 0 300 前日 皮病 アンジ・ファッス 類・ハダー類・ハダー類・ハダー類・ハダー類・ハダー類・ハダー類・ハダー類・ハダー		. –	1	シ							アフェットフロアブル		0	2000	前日	葉かび病・灰色かび病・菌核病
下旬 上旬 クバスココナララミ 水水の病 東京 大大マトラミ 水水の病 中旬 1 1000~1500 前日 万500 前日 万505種・小子とグリバエ類・トマトサビダニケンジャフロアブル 0 1500 前日 万2000 前日 アザミウマ類・ハモグリバエ類・ハモグリバエ類・ハモグリバエ類・ハモグリバエ類・ハモグリバエ類・ハモグリバエ類・ハモグリバエ列・ハモグリバエ がよっとなご病・葉がび病・アンシジスタ類粒水和剤 1 2000~3000 前日 茶がび病・灰色がび病 アブミウス類・ハモグリバエ・オオタバコガ・コナジラミ類 ベルクート水和剤 0 6000 前日 茶がび病・灰色がび病 フララDF 1 4000 前日 茶がび病・灰色がび病 フララDF 1 4000 前日 茶がび病・痰癌・水ので、水皮のがび病 ウララDF 1 4000 前日 茶がび病・痰癌・水ので、水皮のがび病 フェニックス顆粒水和剤 1 2000~4000 前日 オオタバコガ・ハスモンヨトウ サンオイル乳剤 0 300 前日 カナシラミ類・ハモグリバエ・ヨトウ・サンオイル乳剤 0 300 前日 カナシラミ類・ハモグリバエ・ヨトウ・サンオイル乳剤 1 1000 前日 疫病 ハモグリバエ・ヨトウムシ・コナジラミ類 ペネカリグリーン 0 800 前日 ストグリバエ・ヨトウムシ・コナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ マイト乳剤 1 1000 前日 フナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ コマイト乳剤 1 1000 前日 フナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ ハード・20フロアブル 1 1000 前日 フナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ ハード・20フロアブル 1 1000 前日 ア・カー・ア・カー・ア・カー・ア・カー・ア・カー・ア・カー・ア・カー・ア・カー		上旬	ホリハー	ッ							ディアナSC	İ	1	2500	前日	アザミウマ類・ハモグリバエ類・ハスモンヨトウ
下旬 プラミー・	7月	中旬	ラノーテープ	1 7							ベトファイター顆粒水	和剤	0	2000	前日	
上旬	Ì			ジ									1	1000~1500	前日	灰色かび病・輪紋病・斑点病
上旬		下旬		ラミ							コロマイト乳剤		1	1500		コナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ
日 中旬			Ì	l i							ケンジャフロアブル		0	1500	前日	灰色かび病・うどんこ病・葉かび病
8月 中旬 コナジラミ スカリバエ・オオタバコガ・コナジラミ類 下旬 上旬 アサッパス・東京 大夕 大方		上旬		タバ						トフ	ベネビアOD		1	2000	前日	アザミウマ類・ハモグリバエ類・ハモグリバエ類
下旬										ŀ	ファンタジスタ顆粒水	和剤	1	2000~3000	前日	
下旬 ジラミ 人であった。 できます。 できまます。 できまままり。 できままます。 できまままり。 できまままり。 できままます。 できまます。 できまます。 できままます。 できまます。 できままます。 できまます。 できまます。 できまます。 できままます。 できままます。 できまます。 できまます。 できまます。 できまます。 できままます。 できまます。 できまます。 できままます。 できまます。 できまます。 できまます。 できままます。 できままます。 できまます。 できまます。 できままままます。 できまます。 できまままままます。 できまます。 できままままままます。 できまままままままます。 できまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	8月	中旬		그						黄ル	アニキ乳剤		1	1000~2000	前日	ハモグリバエ・オオタバコガ・コナジラミ類
上旬				ジ			集か			葉	ベルクート水和剤		0	6000	前日	葉かび病・灰色かび病
上旬 上旬 上旬 上旬 上旬 大元 がり、スティスンドライフロアブル フェニックス顆粒水和剤 1 2000~4000 前日 末かび病・疫病 カーナン・ラス顆・ハダニ類 フェニックス顆粒水和剤 1 1500 前日 疫病 コナン・ラス類・ハダニ類 ピシロックフロアブル 1 1000 前日 交病 カーナン・ラス類 ピシロックフロアブル 1 1000 前日 水モグリバエ・ヨトウムシ・コナジラミ類 グルーシア乳剤 1 2000 前日 ハモグリバエ・ヨトウムシ・コナジラミ類 グルー・シア乳剤 1 1000 前日 ハチグリバエ・ヨトウムシ・コナジラミ類 ハグレー・シア乳剤 1 1000 前日 フナジラミ類・ハギー・サンプ・スティー・カーアブル 1 1500 前日 コナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ コロマイト乳剤 1 1500 前日 コナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ カーナン・ファイター顆粒水和剤 0 300 前日 コナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ アファイター顆粒水和剤 0 2000 前日 灰色かび病・葉カビ病・うどんこ病 サフオイル乳剤 バトファイター顆粒水和剤 0 2000 前日 疾病 アナン・アラスカーウム・カーナン・アナショトウム・カーナン・アナン・ファイター顆粒水和剤 0 2000 前日 な病 カーナン・ア・ファイター類粒水和剤 0 2000 前日 な病 カーナン・アナショトウム・カーナン・ア・カーウム・カーナン・ア・カーウム・カーナン・ア・カーウム・カーナン・ア・カーウム・カーナン・ア・カーウム・カーナン・ア・カーウム・カーナン・ア・カーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカ		卜旬		ラ			び			巻	ウララDF		1	4000	前日	アブラムシ類・コナジラミ類
9月 中旬				"			病			内		アブル	0	2500	前日	葉かび病・疫病
9月 中旬 10 10 1000 前日 コナジラミ類・ハダニ類 上旬 上旬 中旬 1000 前日 コナジラミ類・ハモグリバエ・ヨトウムシ・コナジラミ類 水カリグリーン 0 800 前日 東かび病・灰色かび病 マイトコーネフロアブル 1 1000 前日 コナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ コロマイト乳剤 1 1500 前日 コナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ パレード20フロアブル 1 2000 前日 アとかび病・薬カビ病・うどんこ病 サフオイル乳剤 0 300 前日 コナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ サフオイル乳剤 0 300 前日 カナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ サフオイル乳剤 0 300 前日 カナジラミ類・ハチではいて類・コナジラミ類・ハスエンマトロー ペトファイター顆粒水和剤 0 2000 前日 ハエイバーボッコナジラミ類・ハスエンマートロー	9月	上旬			ーグ		斑	灰色	疫		フェニックス顆粒水和	剤	1	2000~4000	前日	オオタバコガ・ハスモンヨトウ
9月 中旬 10 10 1000 前日 コナジラミ類・ハダニ類 上旬 上旬 中旬 1000 前日 コナジラミ類・ハモグリバエ・ヨトウムシ・コナジラミ類 水カリグリーン 0 800 前日 東かび病・灰色かび病 マイトコーネフロアブル 1 1000 前日 コナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ コロマイト乳剤 1 1500 前日 コナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ パレード20フロアブル 1 2000 前日 アとかび病・薬カビ病・うどんこ病 サフオイル乳剤 0 300 前日 コナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ サフオイル乳剤 0 300 前日 カナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ サフオイル乳剤 0 300 前日 カナジラミ類・ハチではいて類・コナジラミ類・ハスエンマトロー ペトファイター顆粒水和剤 0 2000 前日 ハエイバーボッコナジラミ類・ハスエンマートロー		4.5			_		点点	か	71内		ザンプロDMフロアブ	ル	1	1500	前日	
 下旬 上旬 上旬 上旬 中旬 上旬 上旬 中旬 上旬 上旬 中旬 上旬 <l< td=""><td>甲旬</td><td></td><td></td><td rowspan="5">エ・アザミウ</td><td rowspan="4">オタバ</td><td rowspan="7">衲</td><td rowspan="3">び</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>サフオイル乳剤</td><td>:</td><td>0</td><td>300</td><td>前日</td><td>コナジラミ類・ハダニ類</td></l<>		甲旬			エ・アザミウ	オタバ	衲	び			サフオイル乳剤	:	0	300	前日	コナジラミ類・ハダニ類
上旬		下戶									ピシロックフロアブル	•	1	1000	前日	· 疫病
上旬 上旬 上旬 かカリグリーンマイトコーネフロアブル 1 1000 前日 次手がします。下旬 1 1000 前日 コナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニのマイト乳剤 1 1500 前日 コナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニのマイト乳剤 1 2000 前日 灰色かび病・葉カビ病・うどんこ病サフオイル乳剤 0 300 前日 コナジ・デ類・ハダニ類ベトファイター顆粒水和剤 0 2000 前日 疫病 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		卜旬									グレーシア乳剤		1	2000	前日	ハモグリバエ・ヨトウムシ・コナジラミ類
10月 中旬 中旬 1000 前日 ハダニ類・トマトサビダニ 下旬 上旬 上旬 上旬 1000 前日 コナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニパレード20フロアブル 1 2000 前日 灰色かび病・葉カビ病・うどんこ病サフオイル乳剤 0 300 前日 コナジラミ類・ハダニ類・ハダニ類・ハダニ類・ハダニ類・ハダニ類・ハダニ類・ハダニ類・ハダニ	1 0	1 –									☆カリグリーン		0	800	前日	葉かび病・灰色かび病
月 中旬 下旬 1 1500 前日 コナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニパレード20フロアブル 1 2000 前日 ア色かび病・葉カビ病・うどんこ病 所日 上旬 上旬 サフオイル乳剤 0 300 前日 コナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ 水・ファイター顆粒水和剤 0 300 前日 コナジラミ類・ハダニ類 水・ハダニ類 水・ハダニ類 水・ハダニ類 水・ハグニス ション・ファイター いまがしばて着・コナジラミ類・ハスエン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファ		上旬									マイトコーネフロアブ	ル	1	1000	前日	ハダニ類・トマトサビダニ
下旬		中旬				•					コロマイト乳剤		1	1500	前日	コナジラミ類・ハモグリバエ類・トマトサビダニ
1 1 1000~2000 前日 疫病 フェキ乳剤 1 1000~2000 前日 皮病 フェキ乳剤 1 1000~2000 前日 カエグリバエ称・コナジラミ称・ハスモンコトウ		下旬				ト					パレード20フロアブル	,	1	2000	前日	灰色かび病・葉カビ病・うどんこ病
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		上旬									サフオイル乳剤	Ī	0	300	前日	コナジラミ類・ハダニ類
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□											ベトファイター顆粒水	和剤	0	2000	前日	疫病
	1 1 月										アニキ乳剤		1	1000~2000	前日	ハモグリバエ類・コナジラミ類・ハスモンヨトウ
月 中旬 「ウンダース 138/3」 1 1500 前日 灰色かび病・菌核病・葉かび病		甲旬									ゲッター水和剤	ļ	1	1500	前日	灰色かび病・菌核病・葉かび病
モスピラン顆粒水溶剤 1 2000 前日 アブラムシ類・コナジラミ類		————									モスピラン顆粒水溶剤	削	1	2000	前日	アブラムシ類・コナジラミ類
		卜旬											1	1000~1500	前日	灰色かび病・輪紋病・斑点病

病害虫の発生状況により下記の薬剤より選択。

<mark>コナジラミ類</mark>:アルバリン顆粒水溶剤(2000~3000倍・前日・2回)、チェス顆粒水和剤(5000倍・前日・3回)、ウララDF(2000倍・前日・3回)、ベネビアOD(2000倍・前日・3回) アドマイヤー顆粒水和剤(5000~10000倍・前日・2回)、アニキ乳剤(1000~2000倍・前日・3回)、コルト顆粒水和剤(4000倍・前日・3回)

|備考<mark>|ハモグリバ</mark>エ:プレオフロアブル(1000倍・前日・2回)、トリガード液剤(1000倍・前日・2回)、カスケード乳剤(2000~4000倍・前日・2回)

☆スピノエース顆粒水和剤(5000倍・前日・2回)、ダントツ水溶剤(2000倍・前日・3回)

<mark>ヨトウムシ類</mark>:フェニックス顆粒水和剤(2000~4000倍・前日・2回)、☆エスマルクDF(1000倍・前日・制限なし)、☆デルフィン顆粒水和剤(1000倍・前日・制限なし)

<mark>オオタバコガ</mark>:プレバソンフロアブル(2000倍・前日・3回)、フェニックス顆粒水和剤(2000倍~4000倍・前日・2回)、アファーム乳剤(2000倍・前日・5回)

☆スピノエース顆粒水和剤(5000倍・前日・2回)

<mark>アブラムシ類:☆プリファード水和剤(1000倍・前日・制限なし)、☆粘着くん液剤(100倍・前日・制限なし)、</mark>トランスフォームF(2000倍・前日・2回)

アザミウマ類:マッチ乳剤《2000~3000倍・前日・2回(ミカンキイロ)》、コテツフロアブル(2000倍・前日・3回)、アーデント水和剤(1000倍・前日・2回)

☆スピノエース顆粒水和剤(5000倍・前日・2回)

ベネビアOD(2000倍・前日・3回) 組ストロビルリン系薬剤を含む農薬を散布した場合には、散布後2週間以上間隔を開けて本剤を使用して下さい。

|<mark>ハ ダ ニ 類</mark> :マイトコーネフロアブル(1000倍・前日・1回)☆サフオイル乳剤(**300倍・前日・制限なし)**

葉かび病:《トリフミン水和剤(3000倍・前日・5回)、トリフミンジェット(400㎡当たり50g・前日・5回)【パンチョと合わせて5回】》、ベルクート水和剤(6000倍・前日・2回)

《ホライズンドライフロアブル(2500倍・前日・3回)【ベトファイター顆粒水溶剤と合わせて3回】》、カンタスドライフロアブル(1000~1500倍・前日・3回)

《アミスターオプティフロアブル(1000倍・7日・2回、ダコニール1000(1000倍・前日・2回) 【プロポーズ顆粒水和剤と合わせて2回】 》

ファンタジスタ顆粒水和剤(2000~3000倍・前日・3回)、サンヨール(500倍・前日・4回)、**☆カリグリーン(800倍・前日・制限なし)**

うどんこ病 :パンチョTF顆粒水和剤(2000倍・前日・2回)、☆カリグリーン(800倍・前日・制限なし)、☆ハーモメイト水溶剤(1000倍・前日・制限なし) 灰色かび病:☆ボトキラー水和剤(ダクト内投入10~15g/10a/日・発病前~発病初期・制限なし)、トップジンM水和剤(1500~2000倍・前日・5日)

ロブラールくん煙剤(300~400㎡当たり・100g・前日・3回以内)、フルピカフロアブル(2000倍・前日・4回)、ベンレート水和剤(2000倍・前日・3回)

ファンタジスタ顆粒水和剤(2000~3000倍・前日・3回)、パレード20フロアブル(2000倍・前日・3回)、セイビアフロアブル(1000倍・前日・3回)

軟腐病:☆コサイド3000(1000倍・制限なし・制限なし)

疫 病:☆Zボルドー(500倍・制限なし・制限なし)、ペンコゼブフロアブル(1000倍・前日・2回)、ライメイフロアブル(2000倍・前日・4回)、ランマンフロアブル(1000~2000倍・前日・4回) ピシロックフロアブル(1000倍・前日・3回)、《ザンプロDMフロアブル(1500倍・前日・3回)、フェスティバルC水和剤(600~800倍・前日・3回)【2薬剤合計で3回まで】》

ベトファイター顆粒水和剤(2000倍・前日・3回)、プロポーズ顆粒水和剤(1500倍・前日・2回)

【2薬剤合計で3回まで】

※黄色粘着板(ホリバー等) 《10a当り200枚》を必ず使用。 ※☆印は天然系農薬で化学合成農薬ではありません。 ※ネコブセンチュウ対策に、ガードホープ液剤を使用して下さい。《4000倍/10a・500ml・前日1回》