

もっと安心農産物 初夏どり 大根 栽培暦 (令和6年度)

(5月どり)

JAちばみどり 銚子野菜連合会

1. 土づくり

完熟堆肥2トン/10aを施用するか、輪作体系にトウモロコシ、マリーゴールドを作付けする

2. 施肥 ☆施肥診断にもとづく施肥量の遵守

	肥料名	施肥量
基肥	根菜配合 606 (6-10-6) 有機態窒素2.7	140kg/10a以下
	または エコレット866(8-6-6) 有機態窒素4.1	120kg/10a以下
	苦土石灰	100kg/10a
	または 硫マグ	40kg/10a
	苦土重焼燐	40kg/10a
	または リンスター30	40kg/10a

3. 防除 ① ② 以外に4薬剤まで使用(Zボルドー・エスマルクDF・スピノエース顆粒水和剤・サブリナフロアブル・クプロシールドは除く)

月	管理 作業	病虫害 の発生 推移	薬剤名	希釈 倍数 ・処理量	対象病虫害	備考 (耕種的防除の実施等)
2月上旬	は種	ネキリムシ —— コナガ・キスジノミハムシ —— ハモグリバエ・アブラムシ —— 白さび病	D-D	20 ^{リットル} /10a	ネグサレセンチュウ	センチュウ対策としてマリーゴールド・エン麦・ハブエースを作付けする
中旬			リゾレックス粉剤	40kg/10a	亀裂褐変症 (リゾトニア菌)	
下旬			①フォース粒剤	9kg/10a	キスジノミハムシ	
3月上旬	間引き		ネマトリンエース粒剤	25kg/10a	ネグサレセンチュウ	
中旬			ダイアジノン粒剤5	6kg/10a	キスジノミハムシ タネバエ	アブラムシ等の防除のため圃場周辺の除草をする
下旬			ハチハチ乳剤 (収穫30日前まで)	2000 倍	コナガ アブラムシ類 キスジノミハムシ ハイマダラノメイガ	降雨が多く病害の発生が予想される場合は ユニフォーム粒剤 9kg/10a ランマンフロアブル 2000倍
4月上旬			ダコニール 1000 (収穫45日前まで)	1000 倍	白さび病 ワッカ症	
			カスミンボルドー (収穫14日前まで)	1000 倍	ワッカ症 黒斑細菌病	コナガの発生が多い場合 ディアナSC 2500~5000 倍 トルネードエースDF2000 倍 プレオフロアブル 1000 倍 グレースシア乳剤2000~3000 倍 カスケード乳剤2000~4000 倍 アクセルフロアブル 1000 倍 (ヨトウムシ)
	中旬		②アファーム乳剤 (収穫7日前まで)	1000 倍	コナガ アオムシ	
	下旬		アトマイヤーフロアブル (収穫14日前まで)	4000 倍	アブラムシ類	
5月上旬	収穫					サブリナフロアブル 1000倍
中旬	↓					クプロシールド 1000倍

☆みんなで守ろう生産基準