

もっと安心農産物 コカブ(冬どり)栽培暦(令和6年)

JAちばみどり 海上野菜組合

- 1.土づくり ●完熟堆肥を施用する ●マリーゴールド・エン麦等を作付する
- 2.施 肥 ●施肥診断にもとづく施肥量の遵守 化学肥料窒素成分使用量 9kg/10a以下
- ※元肥は①～②のいずれかを選択する。

	肥 料 名	施 肥 量
基 肥	①有機アグレット美白名人こかぶ専用(10-10-8 有機態窒素)	120kg/10a以下
	②有機化成NN121号(10-12-10 有機態窒素 1.5)	100kg/10a以下
	苦土重焼燐 (0-35-0)	40kg/10a以下
	苦土石灰	40kg/10a以下

- 3.防 除 ●化学合成農薬 3成分回数まで
(Zボルドー・スピノエース顆粒水和剤・エスマルクDF・ジーファイン水和剤は化学合成農薬に含めない)

月	管理作業	薬剤名	希釈倍数・ 処理量	使用時期	使用 回数	主な対象病害虫	備考 (耕種的防除の実施等)
9月上旬	施肥 播種	D－D	15～20g /10a	作付の10～15 日前まで	1回	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	
10月上旬		フォース粒剤	4kg/10a	播種時	1回	キスジノミハムシ	
		アドマイヤー1粒剤				アブラムシ類	
11月上旬		モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	収穫21日前	1回	アブラムシ類 キスジノミハムシ	
		アフーム乳剤	2000倍	収穫3日前	2回	コナガ	
	スタークル顆粒水溶剤	3000倍 2000倍	収穫3日前	2回	アブラムシ類 キスジノミハムシ		
12月上旬	収穫 ↓	ランマンフロアブル	2000倍	収穫3日前	3回	白さび病 べと病	
		ハチハチ乳剤	2000倍	収穫7日前	1回	コナガ キスジノミハムシ	
1月上旬		アミスター20フロアブル	2000倍	収穫7日前	2回	白さび病 白斑病	
		アクタラ顆粒水溶剤	3000倍	収穫前日	3回	アブラムシ類	
		ブロフレアSC	2000～ 4000倍	収穫前日	3回	コナガ キスジノミハムシ	

化学合成農薬に含めない薬剤

	Zボルドー	500倍	—	—	黒斑細菌病	
	スピノエース顆粒水和剤	5000倍	収穫前日	3回	ハモグリバエ類	
	エスマルクDF	1000倍 1000～2000倍	収穫前日	—	ハイマダラノメイガ コナガ	
	ジーファイン水和剤	1000倍	収穫前日	—	白さび病 軟腐病	

☆みんなで守ろう生産基準