

# もっと安心農産物 春夏ニンジン栽培暦(令和5年)

JA富里市人参部

## 1. 土づくり

前作作付け時に堆肥を施用する  
 または輪作体系にセンチュウ密度抑制効果のある緑肥(ネマクリーン、ニューオーツなど)を作付けする。

## 2. 施肥 ☆施肥前に土壌診断を行う (化学肥料由来の窒素分の上限 10 kg/10a)

	肥料名	保証成分(%)	施肥量(10a)
基肥	①人参ペレット 705	7-10-5 (有機態窒素 3.9)	200 kg以下
	土づくり12号	リン酸 12%、苦土・アルカリ	100 kg /10a
	※その他使用可能土壌改良材 (苦土重焼燐、アズミン苦土石灰、硫マグ、畑のカルシウム、マルチサポート)		

## 3. 防除 化学合成農薬使用総成分回数(成分×回数)は**6カウント**までです

月	管理作業	病害虫の発生推移	薬剤名	希釈倍数・処理量	対象病害虫	備考(耕種的防除の実施等)
12月	耕耘 施肥	センチュウネキリムシ	D-D または ネマトリンエース粒剤 (播種前)	15~20L/10a  15~20kg/10a (ネコブ) 20kg/10a(ネグサレ)	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	ネマトリンエース粒剤は防除効果を高めるため丁寧に土壌混和する(2回ロータリー)
			フォース粒剤 (作条:播種時、全面:播種前) または ダイアジノン粒剤5(播種前)	4kg/10a(作条) 4~12kg(全面) 6kg/10a	ネキリムシ類	しみ腐病の発生が多い圃場は作付けをさける
2月	換気	黒斑病・黒葉枯病・菌核病	クレマート乳剤/U粒剤 または ゴーゴーサン乳剤 /細粒剤F	(乳)200~400ml (粒)4~6 kg/10a  (乳)200~400ml (粒)4~5kg/10a	一年生雑草	
3月						
4月	トンネル除去		ベルコート水和剤 /フロアブル (収穫14日前まで)	(水和剤) 500~1000倍 (フロアブル) 1000倍	黒葉枯病 菌核病 黒葉枯病等	※菌核病について病徴が激しくなると、地際部がとろけて収穫作業が困難となります。過去にスイカ等で発生した圃場は特に注意して、予防を徹底しましょう
5月			スタークル顆粒水溶剤 (収穫7日前まで)	2000倍	アブラムシ類	※ヒョウタンゾウムシ 防除 スタークル顆粒水溶剤 400倍 0.4L/m <sup>2</sup> (灌注) (生育期ただし、収穫21日前まで)
			ストロビーフロアブル (収穫7日前まで)	2000~3000倍	黒葉枯病	トンネル除去後が黒葉枯病の防除適期

その他使用可能薬剤			
ユニフォーム粒剤 ※2成分(2カウント)	9~18 kg/10a	しみ腐病	は種前(全面土壌混和)
ディトラペックス ※2成分(2カウント)	30~40L/10a	しみ腐病 1年生雑草 等	
ドロクロール	一穴当り 2~3ml	センチュウ類 ネキリムシ類 1年生雑草 等	
ネマキック粒剤	15 kg/10a	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	は種前(全面土壌混和)
ビーラム粒剤	20 kg/10a	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	は種前(全面土壌混和)
ロロックス	100~150g/10a	一年生雑草	にんじん 3~5 葉期 但し、収穫 30 日前まで
カイトック細粒剤F ※2成分(2カウント)	3~5 kg/10a	畑地一年生雑草	は種直後(雑草発生前)
カイトック乳剤 ※2成分(2カウント)	300~500ml	畑地一年生雑草	は種直後(雑草発生前)
アフーム乳剤	2000 倍	ハモグリバエ類	収穫前日まで
スミレックス水和剤	1500 倍	菌核病	収穫 30 日前まで
アミスターオプティフロアブル ※2成分(2カウント)	1000 倍	黒葉枯病 菌核病 等	収穫 21 日前まで
ダコニール1000	1000 倍	黒葉枯病	収穫 7 日前まで
アフェットフロアブル	2000 倍	黒葉枯病	収穫 7 日前まで
ジマンダイセン水和剤	400~600 倍	黒葉枯病	収穫 7 日前まで
シグナムWDG ※2成分(2カウント)	2000 倍	うどんこ病 黒葉枯病 等	収穫 14 日前まで
ランネート45DF	1000 倍	ヨウムシ アブラムシ類 等	収穫前日まで ハウスでの使用は避ける
アクセルフロアブル	1000 倍	ハスモンヨトウ ヒョウタンゾウムシ類	収穫前日まで
コテツフロアブル	2000 倍	ヒョウタンゾウムシ類 ヨウムシ 等	収穫前日まで
プレオフロアブル	1000 倍	ハスモンヨトウ	収穫前日まで
フェニックス顆粒水和剤	2000~4000 倍	ヨウムシ	収穫前日まで
アドマイヤー顆粒水和剤	1万倍	アブラムシ類	収穫3日前まで
マラソン乳剤	2000~3000 倍	アブラムシ類 ヤサイゾウムシ 等	収穫 14 日前まで
カスミンボルドー	1000 倍	黒葉枯病 軟腐病 等	収穫 14 日前まで
(ちばエコで化学合成農薬にカウントしない薬剤)			
ゼンターリ顆粒水和剤	1000 倍	ヨウムシ 等	収穫前日まで
スピノエース顆粒水和剤	5000 倍	ハモグリバエ類	収穫 3 日前まで
ポリオキシンAL水和剤	500 倍	黒葉枯病	収穫 7 日前まで
Zボルドー	500 倍~800 倍	黒葉枯病	—

