

もっと安心農産物 食用ナバナ栽培暦

JAいすみナバナ出荷組合ステビア栽培グループ

1.土づくり

土づくりのため、堆肥2,000kg、苦土石灰20～40kgを目安に施用する。

kg

2.施肥 ☆施肥診断に基づく施肥量の遵守(化成由来窒素成分20kg/10a以内)

	肥料名	施肥量	備考
基肥	有機アグレット088号または スーパーマイルド086号	200kg/10a以内	
追肥	燐硝安加里1号	60kg/10a以内	2～3回に分けて実施

3.防除 ☆下記薬剤から選択し、使用する。(7成分以内) 直播と移植で薬剤、使用が異なるので注意

月		管理 業	病害虫発 生の推移	薬 剤 名	希釈倍数 処理量	対象病害虫	備考 (耕種的防除の実施等)	
8月	下旬			バスタ液剤	300ml/10a 播種前または畦間処 理 (収穫21日前まで)	1年生雑草	根こぶ病抵抗性品種 を作付する 立ち枯れ病・根こぶ病 回避のため畝を高くす る	
				フォース粒剤	4kg/10a 播種時土壌混和	キスジノミハムシ(直播)		
9月	上旬	播種		ネビジン粉剤	20kg/10a 作条土壌混和	根こぶ病		
	中旬			オルトラン粒剤	6kg/10a 播種時 播溝土壌混和	アブラムシ類(直播)		
	下旬	移植		ガードベイトA	3kg/10a 定植時 植溝土壌混和	ネキリムシ類		
10月	上旬	間引き		ジーファイン水和剤	1,000倍 穫前日まで	白さび病		病害回避のため間引 きを行う
	中旬			アフーム乳剤	1000～2000倍 収穫7日前	コナガ、アオムシ、 ハスモンヨトウ		
	下旬			ダコニール1000	1000倍 収穫21日前	白さび病 黒斑病 白斑病		
11月	上旬	収穫始						
	中旬	追肥						
	下旬							
12月	上旬	追肥						
	中旬							
	下旬							
1月	上旬	追肥						
	中旬							
	下旬							
2月	上旬	追肥						
	中旬							
	下旬							
3月	上旬	追肥						
	中旬							
	下旬	収穫終						

☆みんなで守ろう生産基準