様式１－３（統一栽培暦様式）

もっと安心農産物　ほうれんそう栽培暦

JA かとり　多古支部　ホウレンソウもっと安心生産班

１．土づくり　☆完熟堆肥を施用する

２．施肥　　☆施肥診断に基づく施肥量の遵守

肥　料　名	保証成分（%）			有機原料由来窒素（%）	10a 当り施肥量	備　考
	N	P	K			
レオユーキＬ	8	8	8	1	85 kg以下	元肥についてはどちらかを選択して使用する。
NK マイルド 028	10	2	8	5．3	125 kg以下	
ヘルシー有機 100 特号	5	6	2	5		有機配合率 100%
味好１号	6	8	4	6		有機配合率 100%
味好２号	7	2	7	7		有機配合率 100%

●土壌分析結果を基に、**レオユーキＬ**または**NK マイルド 028** のどちらかを選択して施用して下さい。**レオユーキＬ、NK マイルド 028** については、**使用量の制限（化成由来窒素成分量 6kg／10a）**がありますので三要素が不足する場合にはヘルシー有機 100 特号又は味好 1－4 号（有機質配合率 100%）で増肥して下さい。

※味好３号（6 - 4 - 4）、味好４号（6 - 8 - 0）につきましては在庫を保有していませんのでご使用の際は経済課まで御連絡下さい。

３．防除　☆防除暦の遵守　　**化学合成農薬５成分回数以下**　　**※ユニフォーム粒剤については２カウント**

	対象病害虫	薬　剤　名	希釈倍数・処理量	使用時期・使用回数
土壌消毒剤	萎凋病・立枯病・苗立枯病・センチュウ類ハリガネムシ類・ネキリムシ類・畑地一年生雑草ホウレンソウケナガコナダニ	クロピク 80 ドロクロール（1）	１穴当り／2~3ml	１回
	萎凋病・立枯病・株腐病・根腐病ホウレンソウケナガコナダニ・一年生雑草	バスアミド微粒剤（1）	20～30kg／10a	播種１０日前まで
	萎凋病・株腐病・立枯病・ホウレンソウケナガコナダニ・一年生雑草・前作の古株枯死	キルパー（1）	60L／10a	播種１５日前まで
	ネコブセンチュウ・ネグサレセンチュウコガネムシ類幼虫	D－D（1）	15～20L／10a (1 穴当り 1.5～2ml)	播種１０～１５日前まで
殺菌剤	べと病	ユニフォーム粒剤（2）※	9kg／10a	播種前　　１回
	べと病	レーバスフロアブル（1）	2000 倍　100～300L/10a	収穫３日前まで・２回以内
	べと病	ランマンフロアブル（1）	2000 倍　100～300L/10a	収穫３日前まで・３回以内
殺虫剤	ミナミキイロアザミウマ	パダン粒剤４（1）	6kg／10a	播種時及び発芽揃時・２回以内
	タネバエ・ヒメクロユスリカ	ダイアジノン粒剤５（1）	6kg／10a	播種時　　播種前・１回
	マメハモグリバエ・シロオビノメイガアシグロハモグリバエ・ハスモンヨトウホウレンソウケナガコナダニ	カスケード乳剤（1）	4000 倍　100～300L/10a	収穫３日前まで・３回以内
	ハスモンヨトウ・ホウレンソウケナガコナダニ	アファーム乳剤　（1）	2000 倍　100～300L/10a	収穫３日前まで・２回以内
	アブラムシ類・アザミウマ類	アドマイヤーフロアブル（1）	4000 倍　100～300L/10a	収穫前日まで・２回以内
	ハスモンヨトウ・シロオビノメイガ	プレバソンフロアブル５（1）	2000 倍　100～300L/10a	収穫前日まで・３回以内
	ホウレンソウケナガコナダニ	コテツベイト（1）	3～6kg／10a	播種時～２葉期まで 但し、収穫１４日前まで・１回

●モンガリット粒剤（1）　4～6kg/10a　播種時・1 回　【 苗立枯病 】

●ガードベイトＡ（1）　3kg/10a　生育初期・2 回以内・株元散布　【ネキリムシ類】

●フェスティバル水和剤（1）　2000 倍　100～300L/10a　収穫前日まで・3 回以内【べと病】

●コテツフロアブル（1）　4000 倍～6000 倍　100～300L/10a　2 葉期まで但し収穫 14 日前まで・1 回【 ホウレンソウケナガコナダニ 】

●フォース粒剤（1）　9kg/10a　播種前　全面土壌混和・1 回　【 ネキリムシ類・ホウレンソウケナガコナダニ 】

●ディアナＳＣ（1）　2500 倍～5000 倍　100～300L/10a　収穫前日まで・2 回以内　【 アザミウマ類・ハスモンヨトウ 】

※上記●の農薬については病害虫の発生が多い場合に追加で使用する。

◎立枯病対策に土壌還元消毒を行う。ハウス開口部にはヨトウムシ類防除のため防虫ネットを展張。

☆ほうれんそう　作型表

品種／月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月
ミラージュ		■	■				■	■	■			
トリトン				■	■							
ブライトン					■	■						
トラッド	■	■						■	■	■	■	■
トラッド7	■									■	■	■
ミストラル	■	■	■						■	■	■	■
ドンキー	■	■	■						■	■	■	■
ピンドン	■	■								■	■	■
ハイドン	■	■	■						■	■		■
エクストリーム	■	■	■						■	■	■	■
オシリス	■	■	■							■	■	■
ジャスティス			■	■		■	■	■				

※ブライトンの６月２０日～末までは要注意（高温による生育の遅延・停止）

※ミラージュの７月１日～１０日までは要注意（抽だいの危険がある）