

# もっと安心農産物 ほうれんそう栽培暦

JA かつり 多古支部 ほうれんそうもっと安心生産班

1. 土づくり ☆完熟堆肥を施用する
2. 施肥 ☆施肥診断に基づく施肥量の遵守

肥料名	保証成分 (%)			有機原料由来窒素 (%)	10a 当り施肥量	備考
	N	P	K			
レオユーキL	8	8	8	1	85 kg以下	元肥についてはどちらかを選択して使用する。
NK マイルド 028	10	2	8	5.3	125 kg以下	
ヘルシー有機 100 特号	5	6	2	5		有機配合率 100%
味好 1号	6	8	4	6		有機配合率 100%
味好 2号	7	2	7	7		有機配合率 100%

●土壌分析結果を基に、レオユーキL またはNK マイルド 028 のどちらかを選択して施用して下さい。レオユーキL、NK マイルド 028 については、使用量の制限(化成由来窒素成分量 6kg/10a)がありますので三要素が不足する場合にはヘルシー有機 100 特号又は味好 1-4 号(有機質配合率 100%)で増肥して下さい。

※味好 3号(6-4-4)、味好 4号(6-8-0)につきましては在庫を保有していませんのでご使用の際は経済課まで御連絡下さい。

3. 防除 ☆防除暦の遵守 **化学合成農薬 5 成分回数以下** **※ユニフォーム粒剤については 2 カウント**

	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数・処理量	使用時期・使用回数
土壌消毒剤	萎凋病・立枯病・苗立枯病・センチュウ類 ハリガネムシ類・ネキリムシ類・畑地一年生雑草 ほうれんそうケナガコナダニ	クロピク 80 ドロクロール (1)	1 穴当り/2~3ml	1 回
	萎凋病・立枯病・株腐病・根腐病 ほうれんそうケナガコナダニ・一年生雑草	バスアミド微粒剤 (1)	20~30kg/10a	播種 10 日前まで
	ネコブセンチュウ・ネグサレセンチュウ コガネムシ類幼虫	D-D (1)	15~20L/10a (1 穴当り 1.5~2ml)	作付の 10~15 日前まで
殺菌剤	べと病	ユニフォーム粒剤 (2) ※	9kg/10a	播種前 1 回
	べと病	レーバスフロアブル (1)	2000 倍 100~300L/10a	収穫 3 日前まで・2 回以内
	べと病	ランマンフロアブル (1)	2000 倍 100~300L/10a	収穫 3 日前まで・3 回以内
殺虫剤	ミナミキイロアザミウマ	パダン粒剤 4 (1)	6kg/10a	播種時及び発芽揃時・2 回以内
	タネバエ・ヒメクロユスリカ	ダイアジノン粒剤 5 (1)	6kg/10a	播種時 播種前・1 回
	マメハモグリバエ・シロオビノメイガ アシグロハモグリバエ・ハスモンヨトウ ほうれんそうケナガコナダニ	カスケード乳剤 (1)	4000 倍 100~300L/10a	収穫 3 日前まで・3 回以内
	ハスモンヨトウ・ほうれんそうケナガコナダニ	アフーム乳剤 (1)	2000 倍 100~300L/10a	収穫 3 日前まで・2 回以内
	アブラムシ類・アザミウマ類	アドマイヤーフロアブル (1)	4000 倍 100~300L/10a	収穫前日まで・2 回以内
	ハスモンヨトウ・シロオビノメイガ	プレバゾンフロアブル 5 (1)	2000 倍 100~300L/10a	収穫前日まで・3 回以内

- モンガリット粒剤 (1) 4~6kg/10a 播種時・1 回 【苗立枯病】
- フェスティバル水和剤 (1) 2000 倍 100~300L/10a 収穫前日まで・3 回以内 【べと病】
- ネマモール粒剤 (1) 30kg/10a 播種前まで・1 回 【コナダニ類】
- コテツフロアブル (1) 4000 倍~6000 倍 100~300L/10a 2 葉期まで但し収穫 14 日前まで・1 回 【ほうれんそうケナガコナダニ】
- フォース粒剤 (1) 9kg/10a 播種前 全面土壌混和・1 回 【ネキリムシ類・ほうれんそうケナガコナダニ】
- アディオン乳剤 (1) 3000 倍 100~300L/10a 収穫 14 日前まで・2 回以内 【アブラムシ類・ハクサイダニ】

※上記●の農薬については病害虫の発生が多い場合に追加で使用する。アディオン乳剤の使用については 10、11、12、1、2 月播種に限定する。

◎立枯病対策に土壌還元消毒を行う。ハウス開口部にはヨトウムシ類防除のため防虫ネットを展張。

☆ほうれんそう 作型表

品種/月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
ミラージュ												
トリトン												
ブライトン												
トラッド												
トラッド7												
ミストラル												
パレード												
ジョーカーセブン												
サカタ 114												
オシリス												
ジャスティス												

※ブライトンの 6 月 20 日~末までは要注意(高温による生育の遅延・停止)

※ミラージュの 7 月 1 日~10 日までは要注意(抽だいの危険がある)