

# もっと安心農産物 キャベツ(春どり)栽培暦(令和3年)

JAちばみどり 海上野菜組合

1.土づくり ●完熟堆肥を施用する ●マリーゴールド・エン麦等を作付する

2.施肥 ●施肥診断にもとづく施肥量の遵守 **化学肥料窒素成分使用量 14kg/10a以下**

※元肥・追肥は①～③のいずれかを選択する。

※③については、施肥量に注意して使用

	肥料名	施肥量
基肥	①マイルドユーキ030号(10-13-10 有機態窒素 5.3)	140kg/10a以下
	②エコレット866 (8-6-6 有機態窒素 4.1)	180kg/10a以下
	③ちばみどり有機888 (8-8-8 有機態窒素 1.2)	※施肥量に注意し使用 120kg/10a以下
	苦土石灰	60kg/10a以下
追肥	①マイルドユーキ030号(10-13-10 有機態窒素 5.3)	80kg/10a以下
	②エコレット866 (8-6-6 有機態窒素 4.1)	100kg/10a以下
	③ちばみどり有機888 (8-8-8 有機態窒素 1.2)	※施肥量に注意し使用 80kg/10a以下

3.防除 ●化学合成農薬 8成分回数まで(苗購入の場合6成分回数まで)

(Zボルドー・スピノエース顆粒水和剤・エスマルクDF・コサイド3000は化学合成農薬に含めない)

月	管理作業	病害虫の発生推移	薬剤名	希釈倍数・処理量	使用時期	使用回数	主な対象病害虫	備考 (耕種的防除の実施等)
9月上旬	播種	ヨトウムシ コナガ・アブラムシ	①フロンサイド粉剤	30～40kg/10a	播種又は定植前	2回	根こぶ病	病害虫の発生量を減らす為、圃場周辺の除草をする 育苗床は害虫防除の為、寒冷紗でトンネル被覆をする
10月上旬			②ディアナSC	2500～5000倍	収穫前日	2回	アオムシ・コナガ・ヨトウムシ	
11月上旬			③ハチハチ乳剤	1000～2000倍	収穫14日前	2回	アブラムシ類・ハイマダラノメイガ・コナガ	
12月上旬	追肥	菌核病	④ファンタジスタ顆粒水和剤	2000～3000倍	収穫3日前	3回	菌核病	作用機種の異なる薬剤をローテーションで使用する
12月上旬			⑤ランマンフロアブル	2000倍	収穫3日前	4回	べと病	土寄せ後、黒腐病の防除を実施する
1月上旬 中旬			⑥カスミンボルドー	1000倍	収穫7日前	4回	黒腐病・軟腐病	
			⑦モスピラン顆粒水溶剤	1000～2000倍 2000～4000倍	収穫7日前 収穫7日前	5回	コナガ アブラムシ類	
2月上旬			⑧ロブラール水和剤	1000倍	収穫7日前	4回	菌核病・株腐病	
4月	収穫							

☆みんなで守ろう生産基準

薬剤名	希釈倍数・ 処理量	使用時期	使用 回数	主な対象病害虫
①フロンサイド粉剤	30～40kg /10a	播種又は定植前	2回	根こぶ病
②ディアナSC	2500～ 5000倍	収穫前日	2回	アオムシ・コナガ・ヨトウムシ
③ハチハチ乳剤	1000～ 2000倍	収穫14日前	2回	アブラムシ類・ハイマダラノ メイガ・コナガ
④ファンタジスタ顆粒水和剤	2000～ 3000倍	収穫3日前	3回	菌核病
⑤ランマンフロアブル	2000倍	収穫3日前	4回	べと病
⑥カスミンボルドー	1000倍	収穫7日前	4回	黒腐病・軟腐病
⑦モスピラン顆粒水溶剤	1000～2000倍	収穫7日前	5回	コナガ
	2000～4000倍	収穫7日前		アブラムシ類
⑧ロブラール水和剤	1000倍	収穫7日前	4回	菌核病・株腐病
<b>※上記薬剤と変更可能</b>				
フォース粒剤	4kg/10a	定植時	1回	ネキリムシ類
オラクル粉剤	20kg/10a	播種前・苗床	2回	根こぶ病 (全面土壌混和)
	30kg/10a	定植前		
トルネードエースDF	1000～ 2000倍	収穫7日前	2回	コナガ・アオムシ
マッチ乳剤	2000～ 3000倍	収穫7日前	3回	コナガ・アオムシ
プレオフロアブル	1000倍	収穫7日前	2回	コナガ・ヨトウムシ
アフーム乳剤	1000～ 2000倍	収穫前日	3回	コナガ・ヨトウムシ
プレバソフロアブル5	2000倍	収穫前日	3回	オオタバコガ・コナガ
ウララDF	2000～ 3000倍	収穫前日	2回	アブラムシ類
モベントフロアブル	2000～4000倍	収穫7日前	3回	アブラムシ類
	2000倍			コナガ・アザミウマ類
ファインセーブフロアブル	1000倍	収穫3日前	2回	アオムシ
	1000～2000倍			コナガ・アザミウマ類
トランスフォームフロアブル	2000倍	収穫前日	3回	アブラムシ類・ネキアザミウマ
パダンSG水溶剤	1500倍	収穫14日前	4回	アブラムシ類・コナガ・ナ メジ類・アオムシ
グレーシア乳剤	2000～ 3000倍	収穫7日前	2回	コナガ・ウワバ類・アオムシ
※1 ブロフレアSC	2000～ 4000倍	収穫前日	3回	コナガ・ウワバ類・アオムシ・ハスモンヨト ウ・ヨトウムシ・オオタバコガ・ハイマ ダラノメイガ
カスケード乳剤	2000～ 4000倍	収穫7日前	2回	コナガ・ハイマダラノメイガ
アフェットフロアブル	2000倍	収穫前日	3回	菌核病・株腐病
セイビアーフロアブル20	1000倍	収穫3日前	3回	菌核病・株腐病
レーバスフロアブル	2000倍	収穫7日前	3回	べと病
リドミルゴールドMZ	1000倍	収穫30日前	3回	べと病
Zボルドー	500倍	—	—	黒腐病
スピノエース顆粒水和剤	2500～ 5000倍	収穫3日前	3回	コナガ・ヨトウムシ
エスマルクDF	1000倍	収穫前日	—	ハイマダラノメイガ
	1000～2000倍			コナガ
コサイド3000	2000倍	—	—	黒腐病・斑点細菌病・ 軟腐病

注:2成分 カウント

※1 令和3年追加薬剤