

# もっと安心農産物 キャベツ(冬どり)栽培暦(令和3年)

JAちばみどり 海上野菜組合

1.土づくり ●完熟堆肥を施用する ●マリーゴールド・エン麦等を作付する

2.施肥 ●施肥診断にもとづく施肥量の遵守 **化学肥料窒素成分使用量 14kg/10a以下**

※元肥・追肥は①～③のいずれかを選択する。 **※③については、施肥量に注意して使用**

	肥料名	施肥量
基肥	①マイルドユーキ030号(10-13-10 有機態窒素 5.3)	140kg/10a以下
	②エコレット866 (8-6-6 有機態窒素 4.1)	180kg/10a以下
	③ちばみどり有機888 (8-8-8 有機態窒素 1.2)	※施肥量に注意し使用 120kg/10a以下
	苦土石灰	60kg/10a以下
追肥	①マイルドユーキ030号(10-13-10 有機態窒素 5.3)	80kg/10a以下
	②エコレット866 (8-6-6 有機態窒素 4.1)	100kg/10a以下
	③ちばみどり有機888 (8-8-8 有機態窒素 1.2)	※施肥量に注意し使用 80kg/10a以下

3.防除 ●**化学合成農薬 8成分回数まで**(苗購入の場合6成分回数まで)  
(Zボルドー・スピノエース顆粒水和剤・エスマルクDF・コサイド3000は化学合成農薬に含めない)

月	管理作業	病害虫の発生推移	薬剤名	希釈倍数・処理量	使用時期	使用回数	主な対象病害虫	備考 (耕種的防除の実施等)
7月下旬 8月上旬	播種	ヨトウムシ・コナガ・アブラムシ・ハイマダラノメイガ・菌核病・黒腐病	①D-D	15~20g/10a	作付の10~15日前まで	1回	ネコブセンチュウ	病害虫の発生量を減らす為、圃場周辺の除草をする 育苗床は害虫防除の為、寒冷紗でトンネル被覆をする  作用機作の異なる薬剤をローテーションで使用する  土寄せ後、黒腐病の防除を実施する
8月中旬 8月下旬	定植		②フロンサイド粉剤	30~40kg/10a	播種又は定植前	2回	根こぶ病	
9月上旬 9月中旬 9月下旬			エスマルクDF	1000~2000倍 1000倍	収穫前日	—	コナガ ハイマダラノメイガ	
10月上旬	追肥		③ハチハチ乳剤	1000~2000倍	収穫14日前	2回	アブラムシ類・ハイマダラノメイガ・コナガ	
10月中旬 10月下旬	収穫		④ファンタジスタ顆粒水和剤	2000~3000倍	収穫3日前	3回	菌核病	
11月上旬			⑤プレオフロアブル	1000倍	収穫7日前	2回	コナガ・ヨトウムシ	
11月中旬 11月下旬			⑥ディアナSC	2500~5000倍	収穫前日	2回	アオムシ・コナガ・ヨトウムシ	
12月上旬 12月中旬 12月下旬	1月		⑦レーバスフロアブル	2000倍	収穫7日前	3回	べと病	
			⑧カスミンボルドー	1000倍	収穫7日前	4回	黒腐病・軟腐病	
			スピノエース顆粒水和剤	2500~5000倍	収穫3日前	3回	コナガ・ヨトウムシ	

☆みんなで守ろう生産基準

薬剤名	希釈倍数・処理量	使用時期	使用回数	主な対象病害虫
①D-D	15～20g/10a	作付の10～15日前まで	1回	ネコブセンチュウ
②フロンサイド粉剤	30～40kg/10a	播種又は定植前	2回	根こぶ病
③ハチハチ乳剤	1000～2000倍	収穫14日前	2回	アブラムシ類・ハイマダラノメイガ・コナガ
④ファンタジスタ顆粒水和剤	2000～3000倍	収穫3日前	3回	菌核病
⑤プレオフロアブル	1000倍	収穫7日前	2回	コナガ・ヨトウムシ
⑥ディアナSC	2500～5000倍	収穫前日	2回	アオムシ・コナガ・ヨトウムシ
⑦レーバスフロアブル	2000倍	収穫7日前	3回	べと病
⑧カスミンボルドー	1000倍	収穫7日前	4回	黒腐病・軟腐病

### ※上記薬剤と変更可能

フォース粒剤	4kg/10a	定植時	1回	ネキリムシ類
オラクル粉剤	20kg/10a 30kg/10a	播種前・苗床 定植前	2回	根こぶ病 (全面土壌混和)
ネビジン粉剤	20～30kg/10a	播種又は定植前	2回	根こぶ病 (全面土壌混和)
モスピラン顆粒水溶剤	1000～2000倍 2000～4000倍	収穫7日前 収穫7日前	5回	コナガ アブラムシ類
トルネードエースDF	1000～2000倍	収穫7日前	2回	コナガ・アオムシ
マッチ乳剤	2000～3000倍	収穫7日前	3回	コナガ・アオムシ
アフーム乳剤	1000～2000倍	収穫前日	3回	コナガ・ヨトウムシ
プレバソフロアブル5	2000倍	収穫前日	3回	オオタバコガ・コナガ
ウララDF	2000～3000倍	収穫前日	2回	アブラムシ類
モベントフロアブル	2000～4000倍 2000倍	収穫7日前	3回	アブラムシ類 コナガ・アザミウマ類
ファインセーブフロアブル	1000倍 1000～2000倍	収穫3日前	2回	アオムシ コナガ・アザミウマ類
トランスフォームフロアブル	2000倍	収穫前日	3回	アブラムシ類・ネギアザミウマ
パダンSG水溶剤	1500倍	収穫14日前	4回	アブラムシ類・コナガ・ナメクジ類・アオムシ
グレーシア乳剤	2000～3000倍	収穫7日前	2回	コナガ・ウワバ類・アオムシ
※1 ブロフレアSC	2000～4000倍	収穫前日	3回	コナガ・ウワバ類・アオムシ・ハスモンヨトウ・ヨトウムシ・オオタバコガ・ハイマダラノメイガ
カスケード乳剤	2000～4000倍	収穫7日前	2回	コナガ・ハイマダラノメイガ
アフエットフロアブル	2000倍	収穫前日	3回	菌核病・株腐病
セイビアーフロアブル20	1000倍	収穫3日前	3回	菌核病・株腐病
ロブラール水和剤	1000倍	収穫7日前	4回	菌核病・株腐病
ランマンフロアブル	2000倍	収穫3日前	4回	べと病
リドミルゴールドMZ	1000倍	収穫30日前	3回	べと病
Zボルドー	500倍	—	—	黒腐病
スピノエース顆粒水和剤	2500～5000倍	収穫3日前	3回	コナガ・ヨトウムシ
エスマルクDF	1000倍 1000～2000倍	収穫前日	—	ハイマダラノメイガ コナガ
コサイド3000	2000倍	—	—	黒腐病・斑点細菌病・軟腐病

注:2成分 カウント

※1 令和3年追加薬剤