

集中豪雨後の対策について

令和8年8月14日

J A全農ちば 営農支援課

令和8年8月13日から14日にかけて、千葉県内で線状降水帯が発生し、記録的な豪雨となった地点もあり、農作物への被害が懸念されます。

まずは圃場の排水に努め、降雨後の高温性病害（軟腐病、白絹病等）の防除を実施しましょう。

また、県担い手支援課作成「8月13、14日の大雨による農作物等被害への事後対策」も合わせて活用しましょう。

1. 品目別の防除薬剤

(1) イチゴ（育苗期） 炭そ病・うどんこ病

FRAC	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数	対象病害	備考
M7.53	フセキワイドフロアブル	1000倍	収穫前日	4回以内	炭そ病 うどんこ病	予防・治療△
M7	ベルコートフロアブル	1000倍	育苗期 (定植前)	5回以内 (苗床)		予防
M3	アントラコール顆粒水和剤	500倍	仮植栽培期	6回以内	炭そ病	予防
M4	オーソサイド水和剤 80	800倍	収穫開始 14日前	5回以内		予防
11	ファンタジスタ顆粒水和剤	2000倍	収穫前日	3回以内		予防・治療
1.10	ゲッター水和剤	1000倍	収穫開始 21日前	3回以内		予防・治療

(2) ネギ 白：白絹病 軟：軟腐病 黒：黒斑病

FRAC	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数 ※	対象 病害	備考
7	アフェットフロアブル	2000倍	収穫前日	2回以内	白・黒	予防
11	メジャーフロアブル	2000倍	収穫前日	3回以内		予防・治療
24.M1	カスミンボルドー※	1000倍	収穫14日前	2回以内		予防・治療
24.31	カセット水和剤※	1000倍	収穫14日前	2回以内	軟	予防・治療
31	スターナ水和剤※	2000倍	収穫7日前	3回以内		予防・治療

※カスミンとカセットは同成分（カスガマイシン）を含むた、カセット・スターナは同成分（オキソリニック酸）を含むため、使用回数に注意しましょう。

(3) ニンジン 枯：黒葉枯病、斑：斑点細菌病、軟：軟腐病

FRAC	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数	対象病害	備考
11	ストロビーフロアブル	2000 倍	収穫 7 日前	3 回以内	枯	予防・治療
24. M1	カスミンボルドー	1000 倍	収穫 7 日前	2 回以内	枯・斑・軟	予防・治療

(4) ナシ 炭そ病

FRAC	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数	備考
11	ストロビードライフロアブル	2000 倍	収穫前日	3 回以内	予防・治療
7・11	ナリアWDG	2000 倍	収穫前日	3 回以内	予防・治療

※農薬使用時は最新の登録内容を確認し、登録内容を守って使用してください。

2. 園芸作物施肥(樹勢回復)

被害により樹勢の低下が見られた場合は、葉面散布を活用して樹勢の回復に努めましょう。

液肥例：ポリコープ2号 4－ 6－ 6＋微量元素、400～600倍

キャッチアップ2号 15－30－15＋微量元素、500倍

野菜の達人 15－14－10、1000倍

●使用時のポイント

- ・ 5～7日おきに2～3回程度、継続的に散布しましょう。
- ・ 高濃度の散布は避け、気温の低い午前中に散布しましょう。特に高温（25度以上）、著しく樹勢が低下している場合は濃度を薄くしましょう。
- ・ 新葉を中心に葉の裏にかかるよう散布しましょう。