

代表的な岐阜県の水稲栽培こよみ(品種:コシヒカリ(平坦地域))

『コシヒカリ』の品種特性

(1)食味が極めて良い早中生品種である。

(2)いもち病や倒伏に弱い。

『土づくりのポイント』

(1)秋耕起と排水の励行。

(2) 稲わら全量還元又は堆肥等有機質の適度な投入。

(3)地力上げ太郎(50kg)施肥。

(4)深耕(目標18cm)

月別	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11～3月	
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	土づくり期間	
生育過程		播種		植え付け			確保期 茎数	分けつ期 最高期	分化期 穂首 形成期 幼穂	分裂期 減数	出穂		乳熟期	糊熟期	成熟								
作業名	①種子消毒	播種・⑤箱施薬散布	②耕起 ③基肥施用	④代かき 田植え	⑥雑草防除 ⑦ジャンボタニシ対策			⑧中干し（かかとが3cm沈む程度）	⑨中間追肥	⑪穂肥散布	⑫病虫害防除 畦畔除草（カメムシ対策）	出穂		⑬落水	⑭収穫							⑮土づくり資材の施用 ⑯秋冬耕起の実施	
水管理					除草剤		⑩間断灌水	中干し				浅水			落水								

作業名	内容(目的)	使用資材名	10a当たり施用量
①種子消毒	種子伝染性病害防除のための靱消毒	ヘルシードTフロアブル	200倍に種子浸漬 (24時間)
	イネシガレセンチュウ防除	スミチオン乳剤	1000倍に種子浸漬 (24時間)
②耕起	代かきに向けての碎土	—	
③基肥散布	(普通肥料)初中期生育に必要な肥料散布	化成肥料14-14-14	20kg
	(一発肥料)生育～登熟に必要な肥料散布	エムコート822	30～40kg
④代かき	漏水防止と田植えのための碎土・均平	—	
⑤箱施薬散布	いもち病や害虫防除のために、箱施薬剤散布	フルスロトル箱粒剤	50g/箱
⑥雑草防除	稲の生育を阻害する雑草防除(初中期一発処理剤)	ディオーレ1キロ粒剤 又はジャンボ [®]	1kg又は400g
		ベツカク1キロ粒剤 又はジャンボ [®] ・豆つぶ250	1kg又は250g
⑦ジャンボタニシ対策	薬剤によるジャンボタニシ防除	スクミノ [®]	1～4kg
		スクミンベイト3	2～4kg

作業名	内容(目的)	使用資材名	10a当たり施用量
⑧中干し	肥料の効かせ方の調節と根への空気(酸素)補給	—	
⑨中間追肥	茎葉硬化による倒伏防止と籾の登熟を向上	マルチサポート1号又は けい酸加里プレミア34	40kg
⑩間断灌水	根の生育に必要な空気(酸素)と水を補給	—	
⑪穂肥散布	籾の登熟充実のため追肥(一発肥料使用時は不要)	化成肥料16-0-16	20kg
⑫病虫害防除	いもち病、もみ枯細菌病当防除 ニカメイチュウ、カメシ、ウナカ類等防除	コラトップスタークル1キロ粒剤	1kg
⑬落水	籾の登熟を促し、収穫の作業性を良くするため収穫1週間前に落水	—	
⑭収穫	品質低下を防ぐため、適期収穫の実施	—	
⑮土づくり資材	稲の生育のための土づくり	地力上げ太郎	50kg
⑯秋冬耕起	有機物、土づくり資材のすき込み、作土深確保のための田起し	—	