

代表的な岐阜県の水稲栽培こよみ(品種:コシカリ(飛騨地域))

『コシカリ』の品種特性 (1)食味が極めて良い品種である。 (2)いもち病や倒伏に弱い。												『土づくりのポイント』 (1)秋耕起と排水の励行。 (3)農力アップ(80kg)施肥。 (2)稲わら全量還元又は堆肥等有機質の適度な投入。 (4)深耕(目標18cm)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

月別	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11～3月								
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	土づくり期間								
生育過程			播種	育苗期		植え付け	活着期	分けつ有効期			分けつ最高期	形成期	幼穂		出穂期	登熟期			収穫期											
作業名	①種子消毒	②耕起	播種		③基肥施用	④代かき	⑥雑草防除	田植え・⑤箱施薬散布		⑦早期中干し		⑨中間追肥	⑦中干し（かかとが3cm沈む程度）		⑩病虫害防除（1）	⑪病虫害防除（2） ⑫穂肥散布（1）	畦畔除草（カメムシ対策）	⑫穂肥散布（2）		出穂		⑬病虫害防除（3）		⑭落水		⑮収穫			⑯土づくり資材の施用	⑰秋冬耕起の実施
水管理							除草剤		中干し 早期	⑧間断灌水		中干し				常時湛水									落水					

作業名	内容(目的)	使用資材名	10a当たり施用量	作業名	内容(目的)	使用資材名	10a当たり施用量
①種子消毒	種子伝染性病害防除のための靱消毒	モモートC・DF	200倍に種子浸漬(24時間)	⑧間断灌水	根の生育に必要な空気(酸素)と水を補給	—	
	イネシガレセンチュウ防除	スミチオン乳剤	1000倍に種子浸漬(24時間)	⑨中間追肥(耕起前40kg)	茎葉硬化による倒伏防止と籾の登熟を向上	けい酸加里プレミア34	30kg
②耕起	代かきに向けての碎土	—		⑩病虫害防除(1)	いもち病防除、登熟歩合向上	フジワン粒剤	4kg
③基肥散布	(普通肥料)初中期生育に必要な肥料散布	コシカリ化成022	30～40kg	⑪病虫害防除(2)	紋枯病防除	リンバー粒剤	4kg
	(一発肥料)生育～登熟に必要な肥料散布	Jコート48号	40～45kg	⑫穂肥散布	籾の登熟充実のため追肥(一発肥料使用時は不要)	マップ484	(1)15kg、(2)10kg
④代かき	漏水防止と田植えのための碎土・均平	—		⑬病虫害防除(3)	ツマグロコバイ、ウンカ類、カメムシ類等の防除	スタークル粒剤又は豆つぶ	3kg又は250g
⑤箱施薬散布	いもち病や害虫防除のために、箱施薬剤散布	Dr.オリゼバディート粒剤 又は デンタルミネト箱粒剤 又は プーシバート箱粒剤	50g/箱	⑭落水	籾の登熟を促し、収穫の作業性を良くするため収穫1週間前に落水	—	
⑥雑草防除	体系処理①(初期剤+初中期一発)	サキトリEW+ディオール1キロ粒剤 又はフロアフル又はジャンボ	500ml+1kg 又は500ml又は400g	⑮収穫	品質低下を防ぐため、適期収穫の実施	—	
	体系処理①(初期剤+初中期一発)	農将軍FL又は先陣ジャンボ又はクリアホーフフロアフル+ディオール1キロ粒剤 又はフロアフル又はジャンボ	500ml又は200g+1kg 又は500ml又は400g	⑯土づくり資材	稲の生育のための土づくり	農力アップ	80kg
⑦早期中干し・中干し	肥料の効かせ方の調節と根への空気(酸素)補給	—		⑰秋冬耕起	有機物、土づくり資材のすき込み、作土深確保のための田起し	—	