



(今週のメニュー)

1. 園芸販売課情報 青果物の市場概況について (園芸部 園芸販売課)
2. 園芸資材課情報 「さらっとらくらくスカイ8」について (別添) (園芸部 園芸資材課)
3. 肥料農薬課情報 「フェルテラスタークル箱粒剤GU」について (別添) (生産資材部 肥料農薬課)
4. 気象情報 (営農総合支援センター)

## 1 園芸販売課情報 青果物の市場概況について

(発信部署: 園芸部 園芸販売課)

内 容:

品名	9月22日 ~ 9月27日		9月29日 ~ 10月4日	
	高値	安値	高値	安値
だいこん (10kg) DB	1,188 ~	540	1,188 ~	432
キャベツ (10kg) DB	2,160 ~	1,296	2,160 ~	864
はくさい (12kg) DB	1,404 ~	540	1,404 ~	540
ほうれん草 (200g) 袋	162 ~	75	129 ~	59
むきねぎ (5kg) DB	~		1,080 ~	432
にら (100g) 束	60 ~	27	57 ~	27
きゅうり (5kg) DB	2,700 ~	648	1,944 ~	216
なす (400g) 袋	184 ~	76	140 ~	54
トマト (4kg) DB	3,024 ~	864	3,348 ~	972
生椎茸 (100g) トレー	184 ~	32	162 ~	32

## 2 園芸資材課情報 「さらっとらくらくスカイ8」について (別添)

(発信部署: 園芸部 園芸資材課)

内 容:

今回は、シーアイ化成(株)の「さらっとらくらくスカイ8」について紹介させていただきます。

※詳細は、別添資料をご覧ください。

お問い合わせ先

全農群馬県本部 園芸部 園芸資材課まで TEL: 027-220-2291

### 3

## 肥料農薬課情報 「フェルテラスタークル箱粒剤 CU」について（別添）

（発信部署：生産資材部 肥料農薬課）

内 容：

水稻育苗箱専用殺虫剤『フェルテラスタークル箱粒剤 CU』について御紹介します。



※商品チラシをご覧ください。


### 4

## 気象情報

（発信部署：営農総合支援センター）

内 容：気象経過（前橋气象台 標高112m）





## ▲みどりの風 放送予定

本放送：月曜日 21時00分～21時30分

再放送：日曜日 8時00分～8時30分



### <今週の放送予定>

#### (第1123回) 「名産品！小松菜と藪塚こだま西瓜」

放送日：10月6日（再放送日：10月12日）

内容：JA太田市より、名産品の小松菜や藪塚こだま西瓜の栽培の様子や、オリジナルの加工品などをご紹介します。

### <次週の放送予定>

#### (第1124回) 「北群渋川の旬を食べに行こう！」

放送日：10月13日（再放送日：10月19日）

内容：JA北群渋川より、みゆきだそば祭りの様子や、旬のりんご・長ネギの栽培の様子などをご紹介します。

営農総合支援センター 生産振興課

(TEL : 027-220-2255 FAX : 027-220-2024)

人と地球と未来にやさしいものづくり



内張り専用農ビ

用途に応じて  
2つのタイプ

サラット らくらく スカイ<sup>イト</sup>8防霧

サラット スカイ<sup>イト</sup>8防霧

- 開閉作業を重視したタイプ!
- 透明性を重視したタイプ!



寒さと過湿から  
作物を優しく  
ガードする!!

## 内張り専用農ビ

# サラット

らくらくスカイ<sup>イト</sup>8防霧

開閉作業性を重視した、  
防霧性内張り農ビです。



- 用途 ●スライド式カーテン用(自動・手動)  
●ハウス内トンネル用  
●巻き取り式カーテン(自動・手動)

当社独自の配合と製造技術により、  
ハウス内の開閉作業に優れています。

●  
ハウス内のキリ・モヤを抑制する  
スカイエイトタイプで、  
適湿な栽培環境にします。

●  
保温性に優れていますので、  
燃費の節約が出来、とても経済的です。

### ■規格

厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
0.05	150, 185, 200, 230, 270	100
0.075	300, 330, 370, 400	

### ■内張り農ビ性能比較データ

商品名	防滴性	防霧性	開閉作業性	透明性
サラットらくらくスカイエイト	◎	○	◎	○
サラットスカイエイト	○	○	○	◎
一般透明農ビ	◎	◎	△	◎

- ご使用上の注意
- ①同製品は内張り専用農ビです。外張りには絶対使用しないで下さい
  - ②カーテンに水がたまったら、必ず水ぬぎをしてください。
  - ③長期使用するためには、シーズンオフに良く乾燥させ、早めに室内に保管してください。

⚠ 警告 1 農業用廃プラスチックの野焼き禁止

⚠ 警告 2 農ビ取扱い上の注意

⚠ 警告 3 展張作業時のケガ防止

⚠ 警告 4 他用途への使用禁止

尚、詳しくは日本ビニル工業会農業用フィルム部会が作成しました「農業用ビニルフィルム使用の手引き」をご参照下さい。

農業用廃プラ 焼くな 捨てるな 集めよう  
～適正処理して再資源～

お願い:「農ビと農ポリを仕分けして、資源回収に協力しよう!」  
農家の皆様が、農ビと農ポリを仕分けしやすいように、農業用ビニール  
には、統一マーク(農ビ)をブルー系でプリントしてあります。

人と地球と未来にやさしいものづくり

\*規格については、予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。



本社 〒104-8321 東京都中央区京橋一丁目18番1号(八重洲宝町ビル)  
 本社 (03) 3635-4571 札幌営業所 (011) 281-5611  
 東京営業部 (03) 3535-4584 名古屋営業所 (052) 204-1394  
 大阪支店 (06) 6444-4574 仙台事務所 (022) 221-1488  
 福岡支店 (092) 271-7214 四国事務所 (088) 852-0545  
 シーアイ化成ホームページアドレス URL: <http://www.cik.co.jp/noubi@home>

代理店

# 水稻育苗箱専用殺虫剤

農林水産省登録  
第23365号

セジロウンカ  
成虫と幼虫

ヒメトビウンカ

トビロウンカ

Powered by  
DuPont®  
RYNAXYPYR®  
Insecticide



STARKLE

ツマグロヨコバイ

コブノメイガ  
成虫と幼虫

## ウンカ類、

## コブノメイガ

## などの 害虫防除に!

# フェルテラ®

# スタークル®

## 箱粒剤CU

クロラントラニリプロール・ジノテフラン粒剤

フェルテラ®、RYNAXYPYR®は米国デュポン社の登録商標  
スタークル・STARKLEは三井化学アグロ(株)の登録商標

# ダブルのチカラ!



三井化学アグロ株式会社

# フェルテラ<sup>®</sup>スタークル<sup>®</sup> 箱粒剤CU

有効成分：クロラントラニプロール…0.75% ジノテフラン…6.0% 人畜毒性：普通物<sup>※</sup>

<sup>※</sup>「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

## ◆ 抵抗性ウンカにも有効!

有効成分ジノテフランは、他剤に抵抗性を獲得したウンカ類にも有効です。

## ◆ 長期残効性!

ジノテフラン含量をアップし、さらに少しずつ溶ける特殊な製剤で、長期に渡り残効性を保ちます。なお、「CU」とは「Content Up(含量アップ)」の意味です。

## ◆ 広い殺虫スペクトラム! チョウ目も同時防除!

チョウ目害虫や水稻初期害虫などに高い効力と長い残効を示すクロラントラニプロールを配合することで、広い殺虫スペクトラムと、チョウ目・ウンカ類の長期同時防除を可能にしました。

## 適用害虫と使用方法

2014年2月1日現在

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り 50g	移植3日前 ～移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する。	1回	4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内)

## 上手な使い方

移植3日前～移植当日に  
育苗箱1箱あたり50gを均一に散布

### ① 箱当り50gを均一に ② 軽く払って ③ 十分に水やり

育苗箱の上から均一になるように散粒してください。



薬剤散粒後、軽く苗の上半分を払い、葉にひっかかっている薬剤を培土の上に落ちさせてください。



最後に上から十分に灌水し、薬剤を培土の上に落ち層かせてください。



## 注意事項

- 本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水してから田植機にかけて移植してください。
- 誤って過剰に使用すると葉先枯れなどの薬害を生じることもあるので、所定の使用量、使用方法を厳守してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病害虫防除等関係機関の指導を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。(甲殻類)
- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、冷蔵で乾燥した場所に密封して保管してください。

○使用前にはラベルをよく読んでください。 ○ラベルの記載以外には使用しないでください。 ○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。  
○容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。 ○防除日誌を記載しましょう。

\*本製品は農業用殺虫剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。

\*本印刷物は2014年2月1日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

JAグループ  
農協 | 全農 | 経済連  
全農は登録商標 第4702318号



三井化学アグロ株式会社  
東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター  
ホームページ <http://www.mitsui-agro.com/>