



(今週のメニュー)

1. 10月各種トラップによる害虫類の発生消長調査結果 (営農総合支援センター)
2. 園芸販売課情報 青果物の市場概況について (園芸部 園芸販売課)
3. 園芸資材課情報 「サニーコート」について (別添) (園芸部 園芸資材課)
4. 肥料農薬課情報 「ファンタジスタ顆粒水和剤」について (別添) (生産資材部 肥料農薬課)
5. 気象情報 (営農総合支援センター)

1 10月各種トラップによる害虫類の発生消長調査結果

(発信部署: 営農総合支援センター)

内 容:

群馬県農業技術センターより、表題の件について連絡がありましたのでお知らせします。以下 URL よりご確認ください。

○群馬県 HP 「病害虫発生予察情報一覧」

<http://www.pref.gunma.jp/07/p14210015.html>

2 園芸販売課情報 青果物の市場概況について

(発信部署: 園芸部 園芸販売課)

内 容:

品 名	11月 4日 ~ 11月 8日		11月10日 ~ 11月15日	
	高値	安値	高値	安値
ほうれん草 (200g) 袋	130 ~	59	108 ~	49
むきねぎ (5kg) DB	1,080 ~	324	1,188 ~	324
しゅんぎく (150g) 袋	81 ~	32	97 ~	32
に ら (100g) 束	65 ~	27	70 ~	32
ブロッコリー (4kg) DB	756 ~	324	540 ~	108
チンゲンサイ (3kg) DB	540 ~	324	540 ~	324
きゅうり (5kg) DB	2,700 ~	648	2,700 ~	648
ト マ ト (4kg) DB	1,404 ~	432	1,620 ~	216
大 和 芋 (4kg) DB	3,564 ~	2,160	3,564 ~	1,620
生 椎 茸 (100g) トレー	162 ~	32	140 ~	43

3

園芸資材課情報 「サニーコート」について（別添）

（発信部署：園芸部 園芸資材課）

内 容：

今回はサニーコートについて紹介させていただきます。この商品は二重構造の保温資材で、保温性・断熱効果に優れております。

※詳細は別添資料のとおりです。

お問い合わせ先

全農群馬県本部 園芸部 園芸資材課まで TEL027-220-2291

4

肥料農薬課情報 「ファンタジスタ顆粒水和剤」について（別添）

（発信部署：生産資材部 肥料農薬課）

内 容：

殺菌剤「ファンタジスタ顆粒水和剤」についてご紹介します。


※商品チラシをご覧ください。



5

気象情報

（発信部署：営農総合支援センター）

内 容：気象経過（前橋气象台 標高112m）





みどりの風 放送予定

本放送：月曜日 21時00分～21時30分

再放送：日曜日 8時00分～8時30分



<今週の放送予定>

(第1129回) 「JA年金友の会親睦グラウンドゴルフ大会」

放送日：11月17日（再放送日：11月23日）
内容：JAバンク群馬信連より、10月29日に開催されたJA年金友の会親睦グラウンドゴルフ大会の様子をご紹介します。

<次週の放送予定>

(第1130回) 「冬の花木流通センターとJA高崎ハム」


放送日：11月24日（再放送日：11月30日）
内容：JA全農ぐんまより、冬の花木流通センターの様子や、JA高崎ハムの新商品をご紹介します。

営農総合支援センター 生産振興課

(TEL : 027-220-2255 FAX : 027-220-2024)

省エネの決定版!! SUNNY COAT

ハウス内に、太陽の恵みをたっぷり吸収。



中空二重構造の保温被覆材

サニーコート®

光線透過率
80%以上

拡散光線 **20%**

空気層

主な特長	サニーコート	0.1mm農ビ	規格
①軽い	○	○	内張り
②熱融着を起こさない(耐熱性)	○	○	タイプ 透明
③保温性が抜群	○	△~○	幅 115cm, 135cm, 150cm, 185cm, 200cm, 230cm, 270cm, 300cm
④光線透過率80%以上(施工直後)	○	○	長さ 100m
⑤ほこりがつきにくい	○	△	
⑥作業性がよい(すべりやすい)	○	○	

⚠️ 安全上のご注意

- ⚠️ 注意** ◎受領時のお願い
サニーコートは長くて重いので、原反・加工品とも荷扱いにご注意ください。
- ⚠️ 注意** ◎保管上の注意
サニーコートは原反・加工品とも、高温・日射・多湿を避けて傷つけないよう保管してください。
保管時には板・支柱等を用いて、荷崩れ防止対策をとってください。
- ⚠️ 注意** ◎展張作業時の注意(外張り使用)
サニーコートの展張作業は、できるだけ風の無い日に行ってください。特にハウス上で作業する場合は、突風にご注意ください。突風によりフィルムがあらわれ、強い力で引っぱられて転落することがありますので、非常に危険です。
- ⚠️ 注意** ◎使用時の注意
サニーコートは可燃物です。火気、熱源から遠ざけてご使用ください。
- ⚠️ 注意** ◎使用済みフィルムに対するお願い
農業用廃プラスチックの野焼きは、法律で禁止されています。サニーコートはポリエチレンを主原料にしていますので、燃やしても有害な塩化水素ガスは発生しません。使用後は産業廃棄物として、法律・政令・条例等の定めに従い処分してください。
- ⚠️ 注意** ◎他用途への使用禁止
サニーコートは農業用被覆資材です。他用途には使用しないでください。

【表示図記号の意味】

- ⚠️ 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

製造発売元



宇部日東化成株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-19

TEL.03(6667)2420 (住友生命日本橋富沢町ビル)

お問合せは

【使用上のご注意】

「農薬が接触しますと劣化を早め、耐水性や流動性が低下する場合があります。直接かからない様ご注意ください。
特に、硫黄煙蒸や硫黄散布は劣化を促進しますのでお控えください。」

中空二重構造の保温被覆材


サニークート

【いちご栽培の実施例】

サニークートを、いちごハウスの内張りに使用した場合。

使用例




- 栃木県内
- いちご(女峰)
- 単棟ハウス(東西棟)
- 無加温
- 設置/1984年12月~
- 測定時期/1985年2月12~18日
- 内張りに使用



使用結果

- 朝夕のハウス内が他のハウスより暖かく感じる。
- 寒波のとき、他のハウスは花芽が黒色になるが、殆ど変化しない。
- 他のハウスよりモヤの発生が少なく短時間で消える。
- 朝早くカーテンを開けなくとも自然に陽光が入るため、管理がラクである。

■ データが物語ります。保温性(断熱性)、採光性をかねそなえたサニークートの優れた効果。



農林水産省登録
第23102号

新発売

果樹・野菜の病害防除に**新戦力!**

攻守に優れた
ミラクルアシスト!!

殺菌剤

ファンタゾスタ®

顆粒水和剤

®はクミアイ化学工業(株)の登録商標



なし黒星病



もも灰星病



ぶどう灰色かび病



キャベツ菌核病

殺菌剤の
オールラウンドプレイヤー
新登場



Defense



殺菌剤
ファンタジスタ[®]
顆粒水和剤

有効成分：ピリベンカルブ……………40.0%
人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)



特長

- 新規系統ベンジルカーバメート系の有効成分ピリベンカルブを含有しています。
- 広範囲の病害に対して高い防除効果を示す総合殺菌剤です。
- 予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
- 各種作物への汚れや薬害発生リスクが少ない剤です。
- 葉の内部への浸達性、茎部から上位葉への浸透移行性を有します。

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数			
りんご	黒星病、モニリア病 褐斑病、斑点落葉病 すす点病、黒点病 輪紋病	3000~4000倍	200~700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内			
	すす斑病、うどんこ病	3000倍								
おうとう	灰星病、幼果菌核病 褐色せん孔病	3000倍								
	黒星病、黒斑病 輪紋病 心腐れ症(胴枯病菌) 炭疽病	3000~4000倍 3000倍								
ぶどう	灰色かび病、晚腐病 黒とう病	3000~4000倍		収穫14日前 まで						
もも	灰星病、黒星病	3000倍		収穫前日 まで						
ネクタリン	ホモフシス腐敗病	3000倍		収穫14日前 まで						
かんきつ	灰色かび病、そうか病 黒点病	2000~4000倍		収穫前日 まで						
茶	炭疽病、輪斑病 新梢枯死症	3000倍		200~400ℓ /10a				摘採7日前 まで	1回	1回
豆類 (種実、ただし、 だいず、らっかせい、 あずき、 いんげんまめを除く)	菌核病 灰色かび病	2000倍		100~300ℓ /10a				収穫7日前 まで	3回以内	散布
あずき	菌核病									
いんげんまめ	灰色かび病、炭疽病									
だいず	菌核病 紫斑病	2000~4000倍								
きゅうり	灰色かび病、菌核病	2000~3000倍	収穫前日 まで							
トマト	灰色かび病									
ミニトマト	菌核病、葉かび病	2000~3000倍	収穫14日前 まで							
なす	灰色かび病、菌核病	2000倍								
いちご	灰色かび病 炭疽病	2000倍	収穫14日前 まで							
キャベツ	菌核病	2000~3000倍								
レタス	灰色かび病、菌核病	2000~3000倍	収穫3日前 まで							
非結球レタス			収穫14日前 まで							
たまねぎ	灰色かび病、小菌核病	2000~4000倍	100~200ℓ /10a	収穫前日 まで	5回以内	5回以内				
	灰色腐敗病	2000~3000倍								

使用上の注意事項

- 使用量に合わせて薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- なすに使用する場合、高温条件下で果実に薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
- 蜜に対して影響があるので、周辺の蜜菜にはかからないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は手袋、長スボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすしてください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

本資料は2013年3月現在の登録内容に基づいています。



製造販売

自然に学び 自然を守る
クミアイ化学工業株式会社

本社：東京都台東区池之端1-4-26 〒110-8782 TEL03-3822-5036
ホームページ <http://www.kumiai-chem.co.jp>

果樹・野菜の病害防除に新戦力

攻守に優れたミミラクルアシスト