営農経済トピックNo.372

平成２７年３月２３日
営農総合支援センター

（今週のメニュー）

１．２月各種トラップによる害虫類の発生消長調査結果（営農総合支援センター）
２．園芸販売課情報　青果物の市場概況について（園芸部 園芸販売課）
３．園芸資材課情報 「ハイメタリックシルバー」について（別添）（園芸部 園芸資材課）
４．肥料農薬課情報 「ダニコングフロアブル」について（別添）（生産資材部 肥料農薬課）
５．気象情報（営農総合支援センター）

1　２月各種トラップによる害虫類の発生消長調査結果

（発信部署：営農総合支援センター）

内　　容：

群馬県農業技術センターより、表題の件について連絡がありましたのでお知らせします。以下 URL よりご確認ください。

○群馬県 HP「病害虫発生予察一覧」

http://www.pref.gunma.jp/07/p14210015.html

2　園芸販売課情報　青果物の市場概況について

（発信部署：園芸部 園芸販売課）

内　　容：

	３月　９日 ～　３月１４日		３月１６日 ～　３月２０日	
品　名	高値	安値	高値	安値
むきねぎ（5kg）DB	１，７２８ ～	５４０	１，７２８ ～	５４０
ほうれん草（200g）袋	１６２ ～	６５	１８４ ～	１０３
山うど（2kg）DB	１，５１２ ～	５４０	１，５１２ ～	５４０
にら（100g）束	６０ ～	４３	６０ ～	４３
きゅうり（5kg）DB	３，２４０ ～	１，５１２	３，２４０ ～	１，２９６
なす（400g）袋	２７０ ～	１９４	２７０ ～	１９４
トマト（4kg）DB	２，７００ ～	８６４	２，４８４ ～	８６４
ミニトマト（200g）パック	２１６ ～	８６	２１６ ～	８６
生椎茸（100g）トレー	１５１ ～	６５	１５１ ～	６５
いちご（300g）パック	４１０ ～	１０５	４１０ ～	１０５

3 園芸資材課情報　「ハイメタリックシルバー」について（別添）

（発信部署:園芸部 園芸資材課）

内　　容：

今回は、シーアイ化成（株）の遮光・断熱性農ビ「ハイメタリックシルバー」について紹介させて頂きます。以下の特長がございます。

①優れた遮光効果

ほぼ完全に光線を遮断し、優れた遮光効果を発揮します。高温になりにくく、遮光栽培に最適です。

②優れた断熱性

夜間の地表からの放熱を反射し、温度低下を防ぎます。

③優れた開閉作業性

べたつきにくく、取り扱いが容易です。特に内張り専用（0.075mm）は収束性に優れ、かさばりません。

④優れた防滴性

⑤高周波加工が可能

※詳細は、別添資料をご覧ください。

お問い合わせ先

全農群馬県本部　園芸部　園芸資材課まで　TEL：０２７－２２０－２２９１

4 肥料農薬課情報　「ダニコングフロアブル」について（別添）

（発信部署：生産資材部 肥料農薬課）

内　　容：

殺ダニ剤『ダニコングフロアブル』について御紹介します。

※別紙リーフレットをご覧ください。

5 気象情報

（発信部署：営農総合支援センター）

内　　容：気象経過（前橋気象台　標高１１２ｍ）







JAみどりの風 放送予定

本放送：月曜日　２１時００分～２１時３０分

再放送：日曜日　　８時００分～　８時３０分

＜今週の放送予定＞

（第１１４７回）「ミルクカップ　ドッジボール選手権大会　前編」

放　　送　　日：３月２３日（再放送日：３月２９日）

内　　容：ＪＡ群馬乳販連より、前橋市内で開催された「ミルクカップドッジボール大会」の様子をご紹介します。

＜次週の放送予定＞

（第１１４８回）「ミルクカップ　ドッジボール選手権大会　後編」

放　　送　　日：３月３０日（再放送日：４月５日）

内　　容：ＪＡ群馬乳販連より、前橋市内で開催された「ミルクカップドッジボール大会」の様子をご紹介します。

営農総合支援センター　生産振興課

（TEL：027－220－2255　　FAX：027－220－2024）

遮光・断熱性農ビ
ハイメタリックシルバー

特長

●優れた遮光効果があります。
ほぼ完全に光線を遮断し、優れた遮光効果を発揮します。高温になりにくく、遮光栽培に最適です。

●断熱性に優れています。
夜間の地表からの放熱を反射し、温度低下を防ぎます。

●開閉作業性に優れています。
べたつきにくく、取り扱いが容易です。特に内張り専用(0.075mm)は収束性に優れ、かさばりません。

●防滴性に優れています。

●一般農ビ同様に高周波加工ができます。

規格

	厚さ(mm)	巾(cm)	長さ(m)
内張り用	0.075	185 210 230	100
外張り用	0.1	270 300	

用途

●遮光栽培用
(菊のシェード栽培、キノコ栽培等)

●ハウス内トンネル・カーテン用

ご使用上の注意

①0.075mmは内張り専用なので、外張りには使用しないで下さい。
②夏場に遮光用として使用する場合、巻き取り式カーテンには使用できません。
③長期使用するためには、シーズンオフに良く乾燥させ、早めに室内に保管して下さい。

⚠ 警告 1　農業用廃プラスチックの野焼き禁止
⚠ 警告 2　農ビ取扱い上の注意
⚠ 警告 3　展張作業時のケガ防止
⚠ 警告 4　他用途への使用禁止

尚、詳しくは日本ビニル工業会農業用フィルム部会が作成しました「農業用ビニルフィルム使用の手引き」をご参照下さい。

農業用廃プラ　焼くな　捨てるな　集めよう
～適正処理して再資源～

お願い:「農ビと農ポリを仕分けして、資源回収に協力しよう!」
農家の皆様が、農ビと農ポリを仕分けしやすいように、農業用ビニールには、統一マーク(農ビ)をブルー系でプリントしてあります。

人と地球と未来にやさしいものづくり

※規格については、予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

シーアイ化成

本社　〒104-8321 東京都中央区京橋一丁目18番1号(八重洲宝町ビル)
本　　社　(03) 3535−4571　　札幌営業所　(011) 281−5611
東京営業部　(03) 3535−4584　　名古屋営業所　(052) 204−1394
大阪支店　(06) 6444−4574　　仙台事務所　(022) 221−1488
福岡支店　(092) 271−7214　　四国事務所　(088) 852−0545
シーアイ化成ホームページアドレス　URL:http://www.cik.co.jp/

代理店

2012.12 ⑤

新登場

明日の農業を考える

殺ダニ剤

ダニコング®

フロアブル

ハダニをねじ伏せる!!

〈写真はイメージです〉

新規有効成分が
ハダニをパワフルに撃退!!

農林水産省登録 第23628号　Ⓡは日本農薬株式会社の登録商標

殺ダニ剤

ダニコング® フロアブル

有効成分：ピフルブミド……20.0%
毒　　性：普通物
（毒劇物に該当しないものを指していう通称）

特　長

新しいタイプの殺ダニ剤 …… 新規作用性を有し、既存殺ダニ剤抵抗性個体群にも有効です。

残効性に優れる …… 残効性に優れ、安定した防除効果が長期間持続します。

天敵・有用昆虫に優しい …… 天敵・有用昆虫を含む非標的昆虫・クモ類への安全性が高く、訪花性昆虫や天敵等の生物資材との併用にも適しています。

既存電子伝達系阻害剤に効果が低下したハダニに対してもパワフルな効果!!

■りんご葉切取残効性試験



日本農薬株式会社(2009年)[社内試験]
作　物：りんご　　品　種：ふじ
対象害虫：ナミハダニ
試験方法：5月28日に所定濃度の薬剤を4ℓ/樹散布、所定日に葉を切取り、雌成虫を接種。接種10日後に次世代幼虫数を調査。

散布28日後の葉でも安定した防除効果を発揮しました!!

適用病害虫および使用方法

（2015年2月現在の登録内容）

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピフルブミドを含む農薬の総使用回数
茶	カンザワハダニ	2000～4000倍	200～400ℓ/10a	摘採7日前まで	1回	散布	1回
かんきつ	ミカンハダニ		200～700ℓ/10a	収穫前日まで			
りんご	ハダニ類	2000倍					
なし							
ぶどう							
もも							
ネクタリン							
かき							
いちじく							
おうとう	ナミハダニ						
小粒核果類							

注意事項

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液などアルカリ性薬剤との混用を避けてください。
- 植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の裏表に十分に散布してください。
- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布むらのないようにていねいに散布してください。
- ハダニ類は薬剤抵抗性が発達し易いので、年1回の散布とし、作用性の異なる他の薬剤と輪番で使用してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。
●使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

JAグループ
農協 | 全農 | 経済連
全農 は登録商標　第4702318号

日本農薬株式会社
東京都中央区京橋1丁目19番8号
カスタマーサービス TEL. 03-6361-1414
ホームページアドレス http://www.nichino.co.jp/

2015年2月作成版(ZN)CS11502J