



営農経済トピックNo.411

平成28年1月18日
営農総合支援センター

(今週のメニュー)

1. 平成27年度病害虫発生予察情報(1月予報)について(別添)(営農総合支援センター)
2. 園芸販売課情報 青果物の市場概況について(園芸部 園芸販売課)
3. 肥料農薬課「ファンタジスタ顆粒水和剤」について(別添)
(生産資材部 肥料農薬課)
4. 気象情報(営農総合支援センター)

1

平成27年度病害虫発生予察情報(1月予報)について(別添)

(発信部署: 営農総合支援センター)

内 容:

群馬県農業技術センターより、表題の件について連絡がありましたのでお知らせします。
下記URLよりご確認ください。

○群馬県HP「農業技術センター」

<http://www.pref.gunma.jp/07/p14210003.html>

2

園芸販売課情報 青果物の市場概況について(発信部署: 園芸部 園芸販売課)

内 容:

品 名	1月5日 ~ 1月9日		1月12日 ~ 1月16日	
	高値	安値	高値	安値
はくさい (13kg) DB	756	324	864	324
ほうれん草 (200g) 袋	151	59	130	59
むきねぎ (5kg) DB	2,268	648	1,728	648
しゅんぎく (150g) 袋	140	54	86	54
にら (100g) 束	86	32	65	32
アスパラガス (100g) 束	324	140	324	140
ブロッコリー (4kg) DB	1,188	216	1,404	432
きゅうり (5kg) DB	2,700	864	2,700	864
生椎茸 (100g) トレー	173	76	162	65
いちご (300g) パック	378	162	454	162

3

肥料農薬課情報「ファンタジスタ顆粒水和剤」について（別添）

（発信部署：生産資材部 肥料農薬課）

内 容：

今回は、殺菌剤『ファンタジスタ顆粒水和剤』についてご紹介します。



※詳細は別添資料をご覧ください。


4

気象情報

（発信部署：営農総合支援センター）

内 容：気象経過（前橋气象台 標高112m）





JAみどりの風 放送予定

本放送：月曜日 21時00分～21時30分

再放送：日曜日 8時00分～8時30分



<今週の放送予定>

(第1190回) 「挑戦！イタリアン野菜」

放送日：1月18日（再放送日：1月24日）
内容：JAたのふじより、県内では珍しい野菜「イタリアン野菜」の栽培に挑むみなさんをご紹介します。

<次週の放送予定>

(第1191回) 「甘みたっぷり！邑美人」

放送日：1月25日（再放送日：1月31日）
内容：JA邑楽館林より、出荷最盛期を迎えたブランド白菜「邑美人」の生産の様子をご紹介します。

営農総合支援センター 生産振興課

(TEL : 027-220-2255 FAX : 027-220-2024)

農林水産省登録
第23102号

果樹・野菜の病害防除に**新戦力!**

攻守に優れた
ミラクルアシスト!!

殺菌剤

ファンタジスタ®

顆粒水和剤

®はクミアイ化学工業(株)の登録商標



殺菌剤の
オールラウンドプレイヤー
新登場



自然に学び 自然を守る



殺菌剤
ファンタジスタ
顆粒水和剤

有効成分：ピリベンカルブ……………40.0%
人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)



特長

- 新規系統ベンジルカーバメート系の有効成分ピリベンカルブを含有しています。
- 広範囲の病害に対して高い防除効果を示す総合殺菌剤です。
- 予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
- 各種作物への汚れや薬害発生リスクが少ない剤です。
- 葉の内部への浸透性、茎部から上位葉への浸透移行性を有します。

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の使用回数	
りんご	黒星病、モニリア病 褐斑病、斑点落葉病 すす点病、黒点病 輪紋病	3000～4000倍	200～700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内	
	すす斑病、うどんこ病 炭疽病	3000倍						
おうとう	灰星病、幼果菌核病 褐色せん孔病							
なし	黒星病、黒斑病 輪紋病 心腐れ症(胴枯病菌)	3000～4000倍		収穫14日前 まで				
	炭疽病	3000倍						
ぶどう	灰色かび病、晚腐病 黒とう病	3000～4000倍		収穫前日 まで				
もも ネクタリン	灰星病、黒星病 ホモフシス腐敗病	3000倍						収穫14日前 まで
かんきつ	灰色かび病、そうか病 黒点病	2000～4000倍						
茶	炭疽病、輪斑病 新梢枯死症	3000倍		200～400ℓ /10a	摘採7日前 まで		1回	1回
豆 類 (薄皮、ただし、 だいず、らっかせい、 あすき、 いんげんまめを除く)	菌核病 灰色かび病	2000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前 まで	3回以内		3回以内	
あすき いんげんまめ	菌核病 灰色かび病、炭疽病							
だいず	菌核病 紫斑病	2000～4000倍		収穫前日 まで				
きゅうり	灰色かび病、菌核病							
トマト	灰色かび病	2000～3000倍		収穫14日前 まで				
ミニトマト	菌核病、葉かび病							
な す	灰色かび病、菌核病							
いちご	灰色かび病 炭疽病	2000倍		収穫14日前 まで				
キャベツ	菌核病 灰色かび病	2000～3000倍 3000倍						
レタス	灰色かび病、菌核病	2000～3000倍		収穫3日前 まで				
非結球レタス					収穫14日前 まで			
たまねぎ	灰色かび病、小菌核病 灰色腐敗病	2000～4000倍 2000～3000倍		100～200ℓ /10a			収穫前日 まで	5回以内

使用上の注意事項

- 使用量に合わせて薬液を調整し、使いきってください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調整してください。
- なすに使用する場合は、高温条件下で果実に薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
- 畜に対して影響があるので、周辺の養蚕にはかからないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は手袋、長スボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすようにしてください。
- 使用後の薬液が生じないように調整を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器等は園場などに放置せず、適切に処理してください。

本資料は2014年10月現在の登録内容に基づいています。



製造販売

自然に学び 自然を守る
クミアイ化学工業株式会社

本社：東京都台東区池之端1-4-26 〒110-8782 TEL03-3822-5036
ホームページ <http://www.kumiai-chem.co.jp>

果樹・野菜の病害防除に新戦力

攻守に優れたミミラクルアシスト