



営農経済トピックNo.413

平成28年2月1日
営農総合支援センター

(今週のメニュー)

1. 園芸販売課情報 青果物の市場概況について (園芸部 園芸販売課)
2. 肥料農薬課情報「スクレアフロアブル」について (別添) (生産資材部 肥料農薬課)
3. 農業機械課情報「アシストスーツのレンタル」について (別添) (生産資材部 農業機械課)
4. 気象情報 (営農総合支援センター)

1

園芸販売課情報 青果物の市場概況について

(発信部署: 園芸部 園芸販売課)

内 容:

品 名	1月18日 ~ 1月23日		1月15日 ~ 1月30日	
	高値	安値	高値	安値
はくさい (13kg) DB	1,080 ~	324	1,296 ~	324
ほうれん草 (200g) 袋	205 ~	43	205 ~	65
むきねぎ (5kg) DB	1,944 ~	540	1,944 ~	648
しゅんぎく (150g) 袋	140 ~	65	140 ~	86
にら (100g) 束	86 ~	32	86 ~	43
アスパラガス (100g) 束	324 ~	140	324 ~	140
ブロッコリー (4kg) DB	2,160 ~	540	2,160 ~	324
きゅうり (5kg) DB	3,564 ~	1,512	3,240 ~	1,728
生椎茸 (100g) トレー	151 ~	65	162 ~	76
いちご (300g) パック	540 ~	162	540 ~	162

2

肥料農薬課情報「スクレアフロアブル」について (別添)

(発信部署: 生産資材部 肥料農薬課)

内 容:

今回は、殺菌剤「スクレアフロアブル」についてご紹介します。

※詳細は別添資料をご覧ください。

3

農業機械課情報「アシストスーツのレンタル」について（別添）

（発信部署：生産資材部 農業機械課）

内 容：

現在の日本農業は、人手不足と高齢化が問題となっています。また、農業は中腰などでの作業が多く、最も腰を痛めやすい業種のひとつです。そこで、農作業の軽労化および怪我を防止することを目的に、平成28年度より「アシストスーツ」のレンタルを開始いたします。

※詳細は別添資料をご覧ください。

【お問合せ先】

生産資材部 農業機械課


TEL 027-220-2312


4

気象情報

（発信部署：営農総合支援センター）

内 容：気象経過（前橋气象台 標高112m）





JAみどりの風 放送予定

本放送：月曜日 21時00分～21時30分

再放送：日曜日 8時00分～8時30分

<今週の放送予定>

(第1192回) 「群馬の名産を世界へ！ミラノ国際博覧会」

放送日：2月1日(再放送日：2月7日)

内容：JA群馬中央会より、昨年10月にイタリア・ミラノで行われた食をテーマにした万博「ミラノ国際万博会」の様子をご紹介します。



<次週の放送予定>

(第1193回) 「かかあ天下の群馬県！女性が作る名産品」

放送日：2月8日(再放送日：2月14日)

内容：JA群馬中央会より、農業の現場で様々な形で活躍する女性農業者のみなさんの取り組みをご紹介します。

営農総合支援センター 生産振興課

(TEL：027-220-2255 FAX：027-220-2024)

なし

もも

豆[※]

葉菜[※]

の殺菌剤!

新発売



スクレア[®]

フロアブル



ナシ黒星病



モモ灰星病



インゲンマメ菌核病



キャベツ菌核病

※登録作物は、裏面の登録内容をご確認下さい

特 長

1. 菌核病に優れた効果
2. ナシ黒星病、モモ灰星病、モモホモプシス腐敗病に優れた効果
3. 収穫前日まで使用可能(但し、茶は摘採3日前まで)

スクレア フロアブル


有効成分：マンデストロピン…40.0%

なし・ももの
病害防除に!
各種作物の
菌核病防除に!



ナシ黒星病に対する効果

平成21年(社)日本植物防疫協会 茨城研究所



品種：長十郎 発生状況：甚発生 区制・面積：1区1樹、3反復
処理方法：5/1,11,21,6/1,11,23の計6回、背負式全自動噴霧器で十分量を散布
調査方法：7/6(最終散布から13日後)に、各区10徒長枝(100葉)の発病度を調査

モモ灰星病に対する効果


平成23年(社)日本植物防疫協会 山梨試験場



品種：早生白鳥 発生状況：多発生 区制・面積：1区1主枝、3反復
処理方法：6/13(幼果期)、2/3(果実肥大期)、7/4(果実肥大期)、14(着色期)の計4回、背負式/バッテリー噴霧器で主枝全体が十分濡れるよう散布
調査方法：7/22(収穫時)に1樹40果収穫し、段ボール箱に入れ(20果実×2箱)、室内(27℃程度)に貯蔵。収穫3,5,7日後に発病果を調査。

インゲンマメ菌核病に対する効果

平成23年(社)日本植物防疫協会 高知試験場



品種：新江戸川 発生状況：中発生(接種) 区制・面積：1区6.24㎡(1.6m×3.9m 26株)、3連制
処理方法：12/5,12,19,26の計4回、背負式全自動噴霧器で10a当たり210~260ℓの割合で散布
調査方法：平成24年1/5(I区およびII区)、6(III区)に、各区全株について調査し発病株率を算出

■適用害虫の範囲及び使用方法

※本剤及びマンデストロピンを含む農薬の総使用回数

2015年9月現在の登録内容

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期	総使用回数※	使用方法
なす きゅうり トマト、ミニトマト キャベツ レタス、非結球レタス メロン すいか 豆類(種実、ただし、だいず、 らっかせいを除く)、豆類(未成熟)	菌核病	2,000	100~300	収穫前日まで	3回以内	散布
非結球あぶらな科葉菜類	炭疽病	2,000~3,000	200~700			
だいず	紫斑病、菌核病					
りんご	黒星病、輪紋病					
ぶどう	晚腐病、黒とう病、うどんこ病					
おうとう	灰星病					
もも、ネクタリン	黒星病、ホモブシス腐敗病					
かき	落葉病					
なし	うどんこ病、輪紋病					
小粒核果類	黒星病					
茶	輪斑病、新梢枯死症、炭疽病、もち病	2,000	200~400	摘採3日前まで		

【使用上の注意】

- 使用前に容器をよく振ってください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけすみやかに散布してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調整して下さい。
- ぶどうに使用する場合、果粉の溶脱を生ずるおそれがあるので注意してください。

- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、できるだけ病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、できるだけ病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●空袋は圃場等に放置せず適切に処理してください。

JAグループ
農 協 | 全 農 | 経済連

協友アグリ株式会社
東京都中央区日本橋小網町6-1
http://www.kyoyu-agri.co.jp

Power Assist Suit



AWN-03

腰部負担の軽減に特化したアシストスーツ


人間の動作をアシストする着型式ロボット。体幹の動きに合わせて、両股部のモータを回転させ、荷役作業時の腰への負担を軽減します。

力が伝わるメカニズム

使用者の足の動きに追従して、ギアが回転し、太ももを押す力と背中から上体を引き上げる力が働くことによって腰への負担を軽減します。

装着のPOINT

股関節の付け根とギアボックス回転中心部の高さを合わせてください。（下図参照）



■ 製品仕様

外寸	高さ80×幅48×奥行27cm	
収納寸法	高さ60×幅45×奥行27cm	
重 量	6.5kg	充電油除く
モータ	AWN-03専用ハイトルクACモータ	2基装備
充電電池	48.1V リチウムイオンバッテリー	保護回路付き
稼働時間	約8時間	終止想定作業量による
動作環境	0～40℃	
想定装着者	身長160～180cm、体重50～80kg	

※ 製品の仕様・形等は予告なく変更される場合があります

作業FLOW

背負う

とめる・調整

スイッチON

調整

持ち上げる

姿勢を保つ

運ぶ

降ろす



リュックを担ぐようにAWNを背負い、股関節の付け根とギアボックス回転中心部の高さを合わせる



バックルを腰→太もも→胸の順にとめ、AWNが体にフィットするようにベルトを調整



直立した状態で電源を入れる



アシスト・ブレーキの強弱を調整する



〈アシストモード〉
上体が引き上げられる



〈ホールドモード〉
上体が保持される



〈歩行モード〉
アシストフリーでスムーズな歩行



〈ブレーキモード〉
付下ろしをアシスト

自動モード切替

モード切替は使用者のスイッチ操作不要。使用者の動きに追従してAWN-03の挙動モードが切り替わります。