



(今週のメニュー)

1. H28年産麦類赤かび病発生状況調査結果について (別添)  
(J A群馬担い手サポートセンター)
2. 園芸販売課情報 青果物の市場概況について (園芸部 園芸販売課)
3. 肥料農薬課情報 水稲用一発処理除草剤「カチボシ」について  
(生産資材部 肥料農薬課) (別添)
4. 気象情報 (J A群馬担い手サポートセンター)

## 1 H28年産麦類赤かび病発生状況調査結果 (別添)

(発信部署: J A群馬担い手サポートセンター)

内 容:

群馬県農業技術センターより、表題の件について連絡がありましたのでお知らせします。

以下 URL よりご確認ください。

○群馬県 HP 「病虫害発生予察一覧」

<http://www.pref.gunma.jp/07/p14210015.html>

## 2 園芸販売課情報 青果物の市場概況について

(発信部署: 園芸部 園芸販売課)

内 容:

品 名	5月23日 ~ 5月28日		5月30日 ~ 6月4日	
	高値	安値	高値	安値
ごぼう (10kg) DB	—	~	—	—
キャベツ (10kg) DB	—	~	—	—
ほうれん草 (200g) 袋	130	~ 76	130	~ 76
レタス (10kg) DB	—	~	—	—
チンゲンサイ (300g) 袋	59	~ 22	59	~ 22
きゅうり (5kg) DB	2,160	~ 648	1,944	~ 540
なす (400g) 袋	216	~ 130	216	~ 130
トマト (4kg) DB	1,188	~ 432	1,188	~ 432
ミニトマト (200g) パック	108	~ 54	108	~ 54
生梅 (10kg) DB	—	~	—	—
			5,400	~ 2,160

### 3

#### 肥料農薬課情報

##### 水稲用一発処理除草剤「カチボシ」について（別添）

（発信部署：生産資材部 肥料農薬課）

内 容：

水稲用一発処理除草剤「カチボシ」についてご紹介します。



※詳細は別添資料をご覧ください。

### 4

#### 気象情報


（発信部署：JA群馬担い手サポートセンター）

内 容：気象経過（前橋气象台 標高112m）





平成28年5月-6月 日照時間(h)



## JAみどりの風 放送予定

本放送：月曜日 21時00分～21時30分

再放送：日曜日 8時00分～8時30分



### <今週の放送予定>

#### (第1210回) 「地元産の新鮮野菜を！」

放送日：6月6日(再放送日：6月12日)  
 内容：JA北群渋川より、たまねぎとテンゲン菜の生産の様子や、学校給食との連携などの取り組みをご紹介します。

### <次週の放送予定>

#### (第1211回) 「みさとの梅」

放送日：6月13日(再放送日：6月19日)  
 内容：JAはぐくみより、東日本一の生産量を誇る梅の生産の様子やおすすめ料理をご紹介します。

JA群馬担い手サポートセンター 生産対策課

(TEL：027-220-2046 FAX：027-220-2024)



水稲用一発処理除草剤

1キロ粒剤51：農林水産省登録 第23514号  
Lフロアブル：農林水産省登録 第23512号  
Lジャンボ：農林水産省登録 第23516号

新登場!!

3剤型揃った

# カチホロ

1キロ粒剤51

Lフロアブル

Lジャンボ

## 連勝街道まっしぐら!!

クログワイ  
オモダカに  
適用拡大!

アゼナ属

クログワイ

ホタルイ

コナギ

オモダカ

ノビエ



※それぞれの地域での適用雑草はラベルをよく確認してご使用ください。 ※適用地帯、資糧によって異なります。

©北真化学工業(株)の登録商標



AVH-301



3種類の有効成分で、田んぼを守る。



ノビエに喝! SU抵抗性雑草に喝!

水稲用一発処理除草剤



1キロ粒剤51 Lフロアブル Lジャンボ

有効成分と含有量	1キロ粒剤51 第23514号	Lフロアブル 第23512号	Lジャンボ 第23516号
使用量(ノ10a)	1kg	500mℓ	300g
イプフェンカルバゾン	2.5%	5.0%	8.3%
テフリルトリオン	2.0%	4.0%	6.7%
ペンシルフロノメチル	0.51%	1.0%	1.7%

特長

◆ノビエに対する長期残効性

新規有効成分イプフェンカルバゾンがノビエの発生を長期間抑えます。

◆SU抵抗性雑草に有効

SU抵抗性ホタルイ、コナギ、アゼナ類等に高い効果を示します。

◆多年生雑草に有効

ウリカワ、ミスガヤツリ等に高い効果を示します。

殺草スペクトラム

処理時期	一年生雑草			多年生雑草					SUR雑草		その他					
	ノビエ	カヤツリグサ科	コナギ	アゼナ類	マツバイ	ヘラオモダカ	ホタルイ	ミスガヤツリ	ウリカワ	オモダカ	クロクワイ	ホタルイ	コナギ	アゼナ類	アオミドロ	表層剥離
発生前	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ノビエ2.5葉期	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○

除草効果 ○:極大、●:大、○:中、△:小

SUR雑草:SU抵抗性雑草

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10アール 当り使用量	総使用回数*	使用方法	適用地帯
1キロ粒剤51	移植水稲 水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミスガヤツリ、ウリカワ、クロクワイ、オモダカ(九州を除く)、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離(九州を除く)	移植時	砂壤土~埴土 埴土~埴土	1kg	本剤 1回 イプフェンカルバゾン 2回 テフリルトリオン 2回 ペンシルフロノメチル 2回	田植同時 散布機で施用	関東・東山・東海、九州の 普通期及び早期栽培地帯 北陸、近畿・中国・四国の 普通期及び早期栽培地帯
		移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	砂壤土~埴土 埴土~埴土			湛水散布	関東・東山・東海、九州の 普通期及び早期栽培地帯 北陸、近畿・中国・四国の 普通期及び早期栽培地帯
		移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	砂壤土			全域	
直播水稲	水田一年生雑草及びホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ	稲1葉期~ノビエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで	埴土~埴土				全域
Lフロアブル	移植水稲 水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミスガヤツリ、ウリカワ、クロクワイ(九州を除く)、オモダカ(北陸、近畿・中国・四国)、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離(関東・東山・東海)	移植時	埴土~埴土 砂壤土~埴土	500mℓ	本剤 1回 イプフェンカルバゾン 2回 テフリルトリオン 2回 ペンシルフロノメチル 2回	田植同時 散布機で施用	北陸 関東・東山・東海、近畿・ 中国・四国、九州の普通期 及び早期栽培地帯
		移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	埴土~埴土 砂壤土			原液 湛水散布	北陸
		移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	砂壤土				
直播水稲	水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミスガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期~ノビエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで	埴土~埴土				全域
Lジャンボ	移植水稲 水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミスガヤツリ、ウリカワ、クロクワイ(九州を除く)、オモダカ(九州を除く)、ヒルムシロ、セリ	移植時	砂壤土~埴土 埴土~埴土	小包装 (パック) 10個 (300g)	本剤 1回 イプフェンカルバゾン 2回 テフリルトリオン 2回 ペンシルフロノメチル 2回	水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる	関東・東山・東海、近畿・中国・四国、 九州の普通期及び早期栽培地帯
		移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	砂壤土				北陸
		移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	砂壤土				全域

\*印は収穫物への残留回数のため、本剤およびそれぞれの有効成分を含む希釈液の総使用回数の制限を示す。

使用上の注意事項

- 苗の植え付けが均一となるように代かきは丁寧にしてください。未熟有機物を前用した場合は、特に丁寧にしてください。
- 散布に当たっては水の出入りを止めて湛水状態のまま田面に均一に散布し、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態(水深3~5cm、ただしジャンボ剤は5~6cm)を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないようにしてください。自然落水により田面の一部が露出する間際になったら、水戻は止めたままにし、通常の水深になるまで水を入れて水口を閉じてください。また、入水は静かに行ってください。
- 以下のような条件下では薬害が発生するおそれがあるので使用を避けてください。
  - ①砂質土壌の水田及び漏水田(減水深2cm/日以上)
  - ②軟弱な苗を移植した水田
  - ③根腐れや浅根の水田および浮き苗の多い水田
- 梅雨期等、散布後に多量の雨が予想される場合は除草効果が低下することがあるので使用を避けてください。
- 本剤はその感草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合には、十分注意してください。
- 散布田の水田水を他の作物に灌水しないで行ってください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合は、気象庁防除所等関係機関の指導を受けてください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。●使用後の空袋・空ボトルなどは農場等に放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記述しましょう。

この印刷物の記載内容は平成27年5月末日現在の登録内容に基づいたものです。



登録商標 第4702318号

23512P01004