



営農経済トピックNo.445

平成28年9月20日

J A群馬担い手サポートセンター

(今週のメニュー)

1. 園芸販売課情報 青果物の市場概況について (園芸部 園芸販売課)
2. 肥料農薬課情報 「オリゼメート粒剤」「カスミンボルドー」「カセット水和剤」について (別添) (生産資材部 肥料農薬課)
3. 気象情報 (J A群馬担い手サポートセンター)

1

園芸販売課情報 青果物の市場概況について

(発信部署：園芸部 園芸販売課)

内 容：

品 名	9月4日～9月10日		9月12日～9月17日	
	高値	安値	高値	安値
だいこん (10kg) DB	1,620	540	1,512	432
キャベツ (10kg) DB	1,296	540	1,620	648
はくさい (12kg) DB	1,296	324	1,296	648
ほうれん草 (200g) 袋	324	108	216	86
にら (100g) 束	65	32	65	32
チンゲンサイ (300g) 袋	97	54	97	54
きゅうり (5kg) DB	2,700	540	2,376	540
なす (400g) 袋	197	54	162	54
トマト (4kg) DB	1,404	432	1,620	432
生椎茸 (100g) トレー	151	54	162	54

**「オリゼメート粒剤」、「カスミンボルドー」、「カセット水和剤」について
(別添)**

(発信部署:生産資材部 肥料農薬課)

内 容 :

殺菌剤「オリゼメート」、「カスミンボルドー」、「カセット水和剤」についてご紹介します。

【オリゼメート】

- ・黒腐病（キャベツ、ブロッコリー）、軟腐病（ねぎ、はくさい）の予防に最適です。
- ※適用作物（抜粋）：ねぎ、きゅうり、レタス、非結球レタス、キャベツ、ブロッコリー
はくさいなど

【カスミンボルドー】

- ・予防と治療をあわせもち、二成分が相乗的に効果を発揮します。
 - ・幅広い作物に使用できます。
- ※適用作物（抜粋）：ねぎ、きゅうり、レタス、非結球レタス、キャベツ、ブロッコリー、だいこん、たまねぎ、トマト、にんじんなど

【カセット水和剤】

- ・細菌性病害に卓効を示し、治療効果も期待できます。
 - ・薬害の心配が少ない。
- ※適用作物（抜粋）：キャベツ、ブロッコリー、はくさい、レタス、非結球レタス、だいこん、たまねぎ、ばれいしょ、にんにく

☆特に、台風や長雨など降雨が続くと、細菌性病害の発生に好適な条件となりますので、早期かつ適切な防除を心がけてください。




※詳細は別添資料をご覧ください

3




気象情報

(発信部署：JA群馬担い手サポートセンター)




内 容：気象経過（前橋气象台 標高112m）






気象経過（観測地点：館林 標高21m）



気象経過（観測地点：沼田 標高 439m）



気象経過（観測地点：田代 標高1,230m）



JAみどりの風 放送予定

本放送：月曜日 21時00分～21時30分

再放送：日曜日 8時00分～ 8時30分



<今週の放送予定>

(第1225回) 「旬の味覚! はるなの梨」

放送日：9月19日（再放送日：9月25日）
内容：JAはぐくみより、はるな地区で生産が盛んな梨の
清算の様子やおすすめ料理をご紹介します。

<次週の放送予定>

(第1226回) 「高崎の魅力を味わう!」

放送日：9月26日（再放送日：10月2日）
内容：JA群馬中央会より、高崎市で生産される農産物「高
崎そだち」の秋のおすすめをご紹介します。

JA群馬担い手サポートセンター 生産対策課

(TEL : 027-220-2046 FAX : 027-220-2024)

細菌性病害(軟腐病、黒腐病、黒斑細菌病など) の発生に注意し、防除を行ないましょう!

※台風、長雨など降雨が続くと、細菌性病害の
発生に好適な条件となります。



キャベツ黒斑細菌病



ねぎ軟腐病



ハクサイ軟腐病

・定植時、ねぎの土寄せ時に

ホフコー

オリゼメート[®]粒剤

登録作物(抜粋):ねぎ、きゅうり、レタス、非結球レタス、
キャベツ、ブロッコリー、はくさいなど

・黒腐病(キャベツ、ブロッコリー)、
軟腐病(ねぎ、白菜)の予防
に最適です。



・生育期の散布剤に

カスミンボルドー[®]

登録作物(抜粋):ねぎ、きゅうり、レタス、非結球レタス
キャベツ、ブロッコリー、だいこん、たまねぎ、トマト、にんじんなど

・予防と治療をあわせもち、二成
分が相乗的に効果を発揮します。
・幅広い作物に使用できます。



カセット[®]水和剤

登録作物:キャベツ、ブロッコリー、はくさい、レタス、
非結球レタス、だいこん、たまねぎ、ばれいしょ、にんにく

・細菌性病害に卓効を示し、
治療効果も期待できます。
・薬害の心配が少ない。



※使用の際は、ラベルの適用内容及び注意事項をよく読んでからご使用ください。

細菌性病害(軟腐病、黒腐病、黒斑細菌病など) の発生に注意し、防除を行ないましょう!

ホフコー ・定植時、ねぎの土寄せ時に

オリゼメート[®]

粒剤

(キャベツ、はくさい、ブロッコリー、ねぎのみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロベナゾールを含む 農薬の総使用回数
キャベツ	黒腐病	6～9kg/10a	定植時	1回	全面土壌混和 又は作条土壌混和	1回
はくさい	軟腐病	6～9kg/10a	は種時又は定植時		全面土壌混和	
ブロッコリー	黒腐病	6～9kg/10a	定植時			
ねぎ	軟腐病	6kg/10a	土寄せ時 但し、収穫30日前まで	2回以内	株元散布	2回以内

・生育期の散布剤に

カスミンボルドー[®]

(キャベツ、ブロッコリー、ねぎのみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガイシンを含む 農薬の総使用回数	銅を含む 農薬の総使用回数
キャベツ	黒腐病 軟腐病 黒斑細菌病	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内	-
ブロッコリー	黒腐病			収穫21日前まで				
ねぎ	軟腐病			収穫14日前まで	2回以内		2回以内	

カセット[®]水和剤

(キャベツ、ブロッコリー、はくさいのみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキシリニック酸を含む農薬の総使用回数	カスガイシンを含む農薬の総使用回数
キャベツ	軟腐病 黒腐病 黒斑細菌病	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内
ブロッコリー	黒腐病	1000倍		収穫21日前まで	2回以内		2回以内	
はくさい	軟腐病 黒斑細菌病	1000倍					3回以内	2回以内

適用病害および使用方法(H28 8月末日現在)

■使用前にはラベルをよく読んでください。 ■ラベルの記載以外には使用しないでください。 ■本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
■空袋、空容器は環境に影響を与えないように適切に処理してください。 ■防除日誌を記載しましょう。

JAグループ
農 協 | 全 農 | 経済連



北興化学工業株式会社

〒103-8341 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号