



(今週のメニュー)

1. 園芸販売課情報 青果物の市場概況について (園芸部 園芸販売課)
2. 肥料農薬課情報 麦用除草剤「リベレーターフロアブル」使用薬量にご注意
ください!!について (別添) (生産資材部 肥料農薬課)
3. 気象情報 (JA群馬担い手サポートセンター)

1

園芸販売課情報 青果物の市場概況について

(発信部署：園芸部 園芸販売課)

内 容：

品 名	10月17日～10月22日		10月24日～10月29日	
	高値	安値	高値	安値
だいこん (10kg) DB	1,944	864	1,944	864
キャベツ (10kg) DB	3,780	1,404	2,700	1,296
はくさい (12kg) DB	2,160	756	1,944	864
ほうれん草 (200g) 袋	216	86	162	76
むきねぎ (5kg) DB	1,836	648	1,728	540
にら (100g) 束	108	43	108	54
きゅうり (5kg) DB	5,940	1,080	3,780	1,080
なす (400g) 袋	216	86	184	86
トマト (4kg) DB	3,564	864	3,564	1,080
生椎茸 (100g) トレ	151	65	130	65

2

肥料農薬課情報

麦用除草剤「リベレーターフロアブル」使用薬量にご注意ください！

(別添)

(発信部署：生産資材部 肥料農薬課)

内 容：

麦用除草剤「リベレーターフロアブル」使用薬量にご注意ください！！

添付リーフレットの記載に従って使用して頂きますと、70ml/反では約7反分、80ml/反では約6反分使用できます。1反当たり100Lの水に80mlの薬液を希釈して処理をすることによって、より高い効果を発揮します。また、タデ科雑草にも高い効果が得られますが、多発圃場ではアクチノール乳剤などとの体系処理をお勧めします。

使用時期に関しましては、「リベレーターフロアブル」で播種後～麦3葉期まで、「リベレーターG(粒剤)」で播種後～麦2葉期までとなっております。また本剤は、雑草の発生前からイネ科雑草1葉期まで有効ですので、使用時期を失わないよう注意して散布してください。

【注意事項】

①麦の白化症状事例

本剤の使用により麦の葉に白化や黄化等が見られる場合がありますが、その後出てくる葉には認められず、やがて回復します。

②麦出芽前の非選択性茎葉処理除草剤の混用

非選択性茎葉処理除草剤を使用する場合は、必ずリベレーターを先に希釈するようにしてください。




※詳細は別添資料をご覧ください

3

気象情報

(発信部署：JA群馬担い手サポートセンター)

内容：気象経過（前橋气象台 標高112m）



JAみどりの風 放送予定

本放送：月曜日 21時00分～21時30分

再放送：日曜日 8時00分～8時30分



<今週の放送予定>

(第1231回)

楽しもう！学ぼう！体験しよう！親子で参加 職能教育

放送日：10月31日（再放送日：11月6日）
内容：JA利根沼田より、子どもたちを対象とした食農教育のイベントの様子や旬を迎えたりんごの生産の様子をご紹介します。

<次週の放送予定>

(第1232回)

JA年金友の会親睦グラウンドゴルフ大会

放送日：11月7日（再放送日：11月13日）
内容：JAバンク群馬より、10/20に前橋市で開催された「JA年金友の会親睦グラウンドゴルフ大会」の様子をご紹介します。

JA群馬担い手サポートセンター 生産対策課

(TEL：027-220-2046 FAX：027-220-2024)



リベレーター®

麦用除草剤

使用薬量に
ご注意ください!
60-80ml / 反

70ml / 反

80ml / 反

70ml 1反分

80ml 1反分

140ml 2反分

160ml 2反分

210ml 3反分

240ml 3反分

280ml 4反分

320ml 4反分

350ml 5反分

400ml 5反分

420ml 6反分

480ml 6反分

490ml 7反分

(10ml あまり)

(20ml あまり)



 Bayer CropScience

© Bayer CropScience

自然に学び自然を守る



クミカ

オススメ 1: 効果 (播種後発生前処理: 処理118日後、発生雑草: スズメノテッポウ)

1反当たり80ml / 100ℓ 処理をする事によって、より高い効果を発揮します。



無処理



60ml / 反



70ml / 反



80ml / 反

タデ科雑草にも高い効果を発揮しますが、
多発圃場ではアクチノール乳剤などとの体系処理をお勧めします。

オススメ 2: 使用時期

リベレーター フロアブル

リベレーター G (粒剤)

散布適期



※本剤は、雑草の発生前からイネ科雑草1葉期まで有効なので、時期を失しないように散布してください。

注意事項



① 麦の白化症状事例

本剤の使用により麦の葉身に白化や黄化等が見られる場合がありますが、その後出てくる葉には認められず回復します。

② 麦出芽前の非選択性茎葉処理除草剤の混用

バスタ液剤との混用は問題ありません。その他の非選択性茎葉処理除草剤を使用される場合は、必ずリベレーターを先に希釈するようにして下さい。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●防除日誌を記載しましょう。