



(今週のメニュー)

1. 「平成28年度 群馬県J A-T A C交流会」の開催について
(J A群馬担い手サポートセンター)
2. 有毒植物ご販売に関する注意喚起 (J A群馬担い手サポートセンター)
3. 園芸販売課情報 青果物の市場概況について (園芸部 園芸販売課)
4. 肥料農薬課情報 うどんこ病殺菌剤「プロパティフロアブル」について (別添)
(生産資材部 肥料農薬課)
5. 気象情報 (J A群馬担い手サポートセンター)

1

「平成28年度 群馬県J A-T A C交流会」の開催について

(発信部署：J A群馬担い手サポートセンター)

内 容：

2月15日(水)、新前橋ラシーネにおいて、「平成28年度 群馬県J A-T A C交流会」を開催しました。交流会では、T A C活動優秀表彰や受賞者による取組事例発表、農業ジャーナリスト小谷あゆみ氏「地域を元気にするこれからの農業の魅力とは」と題した基調講演などを行いました。優秀表彰者の取組事例は、次号よりご紹介させていただきます。



<T A C活動優秀表彰者 (J A) 一覧>



(T A C担当部門)	J A前橋市	吉田 友駿 様
(T A C担当部門)	J Aはぐくみ	下平 将成 様
(T A C担当部門)	J Aたのふじ	高見友里恵 様
(T A C担当部門)	J A甘楽富岡	野口 瞬 様
(T A C新人部門)	J A利根沼田	高橋 敏行 様
(J A部門)	J A佐波伊勢崎	

2

有毒植物ご販売に関する注意喚起

(発信部署：ＪＡ群馬担い手サポートセンター)

内 容：

農林水産省は、野菜や山菜に似た有毒植物の誤食による食中毒を防止するため、野菜や山菜を出荷する生産者や消費者の皆様が、これらの植物の特徴を知るためのリーフレット「野菜・山菜とそれに似た有毒植物」を作成し、ウェブサイトに掲載しています。
新たに、「フキ（ふきのとう）とそれに似た有毒植物の特徴を知るためのリーフレット」が作成されました。

「野菜・山菜とそれに似た有毒植物」

URL：<http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/rinsanbutsu/leaflet.html>

No.1 ニラ（間違いやすい有毒植物：スイセン類、スノーフレークなど）

No.2 ギョウジャニンニク（間違いやすい有毒植物：コルチカム、スズランなど）

No.3 ギボウシ類（間違いやすい有毒植物：バイケイソウ類、コルチカムなど）

（新）No.4 フキ（間違いやすい有毒植物：ハシリドコロ、フクジュソウなど）

3

園芸販売課情報 青果物の市場概況について

(発信部署：園芸部 園芸販売課)

内 容：

品 名	2月6日～2月10日		2月13日～2月18日	
	高値	安値	高値	安値
はくさい（13kg）DB	1,728	～ 648	2,160	～ 864
ほうれん草（200g）袋	108	～ 43	119	～ 43
むきねぎ（5kg）DB	2,160	～ 540	2,376	～ 756
山うど（2kg）DB	1,836	～ 540	1,836	～ 540
しゅんぎく（150g）袋	103	～ 59	97	～ 54
にら（100g）束	97	～ 65	97	～ 70
きゅうり（5kg）DB	2,376	～ 860	2,484	～ 756
トマト（4kg）DB	1,836	～ 756	1,728	～ 756
生椎茸（100g）トレ	140	～ 76	140	～ 76
いちご（300g）パック	432	～ 216	432	～ 216

うどんこ病殺菌剤「プロパティフロアブル」について（別添）

（発信部署：生産資材部 肥料農薬課）

内 容：

うどんこ病殺菌剤「プロパティフロアブル」について紹介します。

【特長】

●うどんこ病の様々なステージに作用！

●各種うどんこ病菌に優れた効果！

⇒既存の剤とは異なる新しい作用機構を持ち、防除が困難な内部寄生性のうどんこ病にも高い効果を示します。

●次世代の菌密度を低減させ、病害の拡大を抑える！

⇒うどんこ病の孢子形成を強く阻害し、次世代の菌密度を効率的に抑えます。

●葉内に広がり作物をしっかり守る！

⇒有効成分が葉内のあらゆる方向に広がり、一定期間留まることで安定した防除効果が得られ、残効性や耐雨性が向上します。

●天敵、有用昆虫に対する高い安全性！

⇒天敵、訪花昆虫に対して影響がほとんどなく、総合防除（IPM）に適した薬剤です。

【使用上の注意】

●出来るだけ発病前または発病初期に散布してください。

●使用薬量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節して下さい。

●保管の際は、密閉し直射日光を避け、食品と区別して冷涼な場所に保管してください。




※詳細は別添資料をご覧ください。

5




気象情報

(発信部署：JA群馬担い手サポートセンター)




内容：気象経過（前橋气象台 標高112m）






気象経過（観測地点：館林 標高 21 m）



気象経過（観測地点：沼田 標高 439m）



気象経過（観測地点：田代 標高 1, 230m）



JAみどりの風

放送予定

本放送：月曜日 21時00分～21時30分

再放送：日曜日 8時00分～ 8時30分



<今週の放送予定>

(第1247回) 「将群馬の農業を巡る旅 第2弾」

放送日：2月20日（再放送日：2月26日）
内容：県内各地を訪問し、その地の農業についてご紹介する「群馬の農業を巡る旅」。今回は、この時季ならではの農産物などをご紹介します。

<次週の放送予定>

(第1248回) 「ミルクカップドッジボール選手権大会」

放送日：2月27日（再放送日：3月5日）
内容：2/4 に開催された「ミルクカップドッジボール選手権大会」の様をご紹介します。

JA群馬担い手サポートセンター 生産対策課
(TEL：027-220-2046 FAX：027-220-2024)

農林水産省登録
第23368号

新規うどんこ病殺菌剤

プロパティ®

フロアブル

®は石原産業株式の登録商標

うどんこ病防除に2つの効果

サニテーション効果で
病斑拡大をブロック

マルチスプレッド効果で
病原菌からプロテクト



うどんこ病に 優れた効果



農林水産省登録 第23368号
人畜毒性: 普通物 (両動物に該当しないものを指している通称)
有効成分: ビリオフェノン
26.8% (W/W) (30% (W/V))


プロパティフロアブルの特長

- **うどんこ病菌の様々なステージに作用**
付着器、吸器、胞子の形成、菌糸の伸長に作用し、うどんこ病菌の生育に関わる様々なステージにおいて阻害効果を発揮します。
- **各種うどんこ病菌に優れた効果**
既存の薬剤とは異なる新しい作用機構を持ち、きゅうり、なすなどの表皮寄生性のうどんこ病はもとより、防除が困難な内部寄生性のうどんこ病にも高い効果を示します。
- **サニテーション効果(次世代菌密度低減効果)により、病害の拡大を抑える**
うどんこ病の胞子形成を強く阻害し、胞子飛散による病害の拡大を防ぐことで、次世代の菌密度を効率的に抑えます。
- **マルチスブレード効果で作物をしっかりと守る**
成分が速やかに葉内で拡散し、吸器形成を強く阻害することで病斑の拡大を抑え、安定した防除効果を発揮します。
- **天敵、有用昆虫に対する高い安全性**
訪花昆虫や天敵に影響がほとんどなく、総合防除(IPM)に適合した薬剤です。

うどんこ病防除に2つの効果


サニテーション効果

胞子形成を著しく阻害し、次世代の病原菌密度を低下させます。



胞子の分裂異常や、胞子柄に奇形が生じる。

マルチスブレード効果



マルチスブレード効果により、葉内のあらゆる方向に広がった有効成分が一定期間留まることで安定した防除効果が得られ、残効性や耐雨性の向上に寄与します。

適用作物と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	10アール当り 使用液量(ℓ)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ビリオフェノンを含む 農薬の総使用回数			
 小麦	うどんこ病	3,000～ 4,000	60～150	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内			
 きゅうり			100～300	収穫前日まで						
 いちご		3,000								
 なす										

本内容は、平成25年10月22日付の登録内容に基づいています。

⚠ 使用上の注意事項

- 使用直前に容器をよく振ってください。
- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。
- 出来るだけ発病前または発病初期に散布してください。
- 使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせ調整してください。
- 本剤の使用にあたっては、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

⚠ 安全使用上の注意

- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 保管…密封し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼な所に保管してください。

● 使用前にラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。● 空容器は園場などに放置せず、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

本印刷物は平成26年11月時点での知見に基づいて作成しています。

5倍から10倍まで濃く薄く調整可能
適用作物、基準(希釈倍数)、
使用時期、使用回数を守りましょう
石原は「食の安全」を大切にします