



速く効く。
あの害虫にも効く。
だから、
収量に差がつく。

**対象害虫の
幅広さ**

チョウ目害虫や
アザミウマなど
幅広い害虫^{*1}に効く。


効きの速さ

有効成分が直接
害虫に作用するから、
作物が食べられる前に
駆除できる。

さらに多くの害虫に使えるようになった!

野菜・
茶用
殺虫剤

グレースシア[®] 乳剤



- 有効成分フルキサメタミド配合。
抵抗性コナガにも卓効
- 葉内に薬剤が浸透、
葉裏の害虫も退治
- 幅広いチョウ目害虫に効果
- 殺虫効果は約2週間持続



*1 作物によって適用害虫は異なります。詳しくは裏面をご覧ください。
*2 効果は害虫の発生密度や天候、栽培環境等によって異なる場合があります。

速く効く。あの害虫にも効く。

グレースシア[®] 乳剤

農林水産省登録 第24185号 有効成分 フルキサメタミド…10.0% 人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 容量：250ml入、500ml入

グレースシアは、「効きの速さ」と「対象害虫の幅広さ」を兼ね備えた野菜・茶用殺虫剤です。

POINT

01

効きの速さ

有効成分が直接害虫に作用するから、作物が食べられる前*に駆除できる。

*グレースシアの速効性については、右の試験写真をご覧ください。

POINT

02

対象害虫の幅広さ

チョウ目害虫やアザミウマなど幅広い害虫*に卓効。

*作物によって適用害虫は異なります。詳しくは下の表をご覧ください。

■ 速く効くから、収量に差がつかます。



2018年 日産化学生物科学研究所（社内試験）【試験方法】虫体浸漬、処理1時間後投入、20時間後撮影

適用害虫と使用方法

*本剤及びフルキサメタミドを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量 (/10a)	使用時期	総使用回数*	使用方法					
さといも	ハスモンヨトウ	2000~3000倍	100~300L	収穫7日前まで	2回以内	散布					
かんしょ	ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ、コナジラミ類、ハダニ類										
だいこん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ、キスジノミハムシ										
はくさい	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、オオタバコガ、ネギアザミウマ										
キャベツ	コナガ、アオムシ、ウワバ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、アザミウマ類、ハイマダラノメイガ										
カリフラワー	コナガ、アオムシ、ネギアザミウマ、ハスモンヨトウ										
ブロッコリー	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ウワバ類、オオタバコガ、ハイマダラノメイガ、ネギアザミウマ										
レタス、非結球レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ナモグリバエ、アザミウマ類										
たまねぎ	ネギアザミウマ										
ねぎ	ネギコガ、ネギハモグリバエ、シロイチモジヨトウ、アザミウマ類										
トマト、ミニトマト	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、コナジラミ類、アザミウマ類、トマトサビダニ、トマトハモグリバエ	2000倍	100~300L	収穫前日まで	2回以内	散布					
ピーマン	オオタバコガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、チャノホコリダニ										
なす	コナジラミ類、アザミウマ類、ハダニ類、チャノホコリダニ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、トマトハモグリバエ										
きゅうり	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、ハダニ類、コナジラミ類、トマトハモグリバエ										
すいか	オオタバコガ、ウリノメイガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、ハスモンヨトウ										
メロン	アザミウマ類、コナジラミ類、ウリノメイガ、ハダニ類										
だいち	マメシクイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ウコンノメイガ、オオタバコガ、フタスジヒメハムシ						2000~3000倍	200~400L	収穫14日前まで	1回	
豆類（未成熟、ただし、えだまめを除く）	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類										
えだまめ	マメシクイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ウコンノメイガ、オオタバコガ、フタスジヒメハムシ										
いちご	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハダニ類						2000倍	200~400L	摘採14日前まで	1回	
茶	チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメコバエ、マダラカサハラハムシ、ヨモギエダシヤク、チャノホソガ、チャトゲコナジラミ										
きく	サビダニ類、チャノホコリダニ	2000~3000倍									
きく	ハスモンヨトウ、ハダニ類、オオタバコガ、アザミウマ類	2000倍	100~300L	発生初期	2回以内						
りんどう	リンドウホソハマキ、ハダニ類、アザミウマ類										

使用上の注意事項（抜粋）

●天敵類に影響があるので使用に際しては注意してください。●水不足、質茂なすの果実には葉害を生じるので、使用しないでください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2019年10月現在の登録内容に基づいています。