

黒腐病・軟腐病・黒斑細菌病など各種細菌性病害に！

農林水産省登録 第14625号

カスミンボルドー®

有効成分：カスガマイシンー塩酸塩 5.7%（カスガマイシンとして 5.0%）

塩基性塩化銅 75.6%（銅として 45.0%）
®は北興化学工業㈱の登録商標



かんきつ/かいよう病



なし/黒星病



もも/せん孔細菌病
縮葉病



びわ/ 灰斑病
がんしゅ病



キウイフルーツ/かいよう病
花腐細菌病



いんげんまめ/かいよう病
花腐細菌病



きゅうり/うどんこ病
斑点細菌病
べと病



すいか/うどんこ病
褐斑細菌病
果実汚斑細菌病



メロン/うどんこ病
斑点細菌病
果実汚斑細菌病



トマト/葉かび病
輪紋病
軟腐病
疫病
斑点細菌病
かいよう病



ピーマン/うどんこ病
斑点細菌病
斑点病



とうがらし類/うどんこ病
斑点細菌病
斑点病



キャベツ/黒腐病
軟腐病
黒斑細菌病



メキャベツ/黒腐病



ブロッコリー/黒腐病



レタス/腐敗病
斑点細菌病



非結球レタス/腐敗病
斑点細菌病



だいこん/軟腐病
黒斑細菌病
ワツカ症



ごぼう/黒斑細菌病



ねぎ/軟腐病



たまねぎ/軟腐病



にんじん/黒葉枯病
軟腐病
斑点細菌病

※上記以外になばな、にんにく、オクラ、ばれいしょ、てんさい、あずき、茶、ばら、ほおずき、ゆり、たばこに適用があります。

■特長

①幅広い登録内容

幅広い作物に登録があり、細菌性病害だけでなく、糸状菌による病害にも有効です。

②耐性菌出現の可能性が低い

作用性の異なる、「カスガマイシン」と「銅」の混合により、耐性菌出現のリスクを抑えます。

③治療効果と予防効果を併せ持つ

治療効果のある「カスガマイシン」と予防効果のある「銅」が相乗的に効果を発揮します。



適用病害および使用方法 (平成28年9月末日現在の登録内容)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	銅を含む農薬の総使用回数				
かんきつ(みかんを除く)	かいはよう病	1000倍	200~700L/10a	収穫45日前まで	5回以内	散布	5回以内					
				収穫7日前まで								
なし	黒星病	500倍	200~700L/10a	収穫後(10月~11月)	2回以内				2回以内			
もも	せん孔細菌病 縮葉病			開花前まで	3回以内				3回以内			
びわ	灰斑病 がんしゅ病	1000倍	200~700L/10a	幼果期まで	4回以内				4回以内(樹幹注入は1回以内)			
キウイフルーツ	かいはよう病 花腐細菌病	500倍		休眠期								
いんげんまめ	かさ枯病	1000倍	100~300L/10a	発芽後養生期(新梢長約10cm)まで	3回以内				3回以内(種子粉衣は1回以内)			
あずき	褐斑細菌病 茎腐細菌病			収穫30日前まで								
きゅうり	斑点細菌病 うどんこ病 べと病			収穫前日まで						5回以内	5回以内	
すいか	うどんこ病 褐斑細菌病 果実汚斑細菌病			収穫3日前まで								
メロン	うどんこ病 斑点細菌病 果実汚斑細菌病			収穫前日まで								
トマト	葉かび病 輪紋病 疫病 斑点細菌病 かいはよう病 軟腐病			収穫前日まで								
ピーマン	うどんこ病 斑点細菌病			収穫開始14日前まで								
とうがらし類	斑点病			収穫7日前まで								
キャベツ	黒腐病 軟腐病 黒斑細菌病			収穫21日前まで								
ブロッコリー	黒腐病			収穫14日前まで								
だいこん	軟腐病 黒斑細菌病 ワッカ症			3回以内								
ねぎ	軟腐病			2回以内								
たまねぎ	軟腐病			5回以内								
ごぼう	黒斑細菌病			3回以内								
レタス	腐敗病 斑点細菌病			4回以内								
非結球レタス	腐敗病 斑点細菌病			4回以内								
なばな	黒腐病			3回以内								
にんにく	春腐病			5回以内								
ばれいしょ	軟腐病			500~800倍		25L/10a	収穫7日前まで	3回以内				4回以内(種いも浸漬は1回以内、 植付後は3回以内)
	疫病			800倍								
てんさい	褐斑病	800~1000倍	100~300L/10a	収穫14日前まで	5回以内	5回以内						
	斑点病 斑点細菌病	200倍 800倍										
にんじん	黒葉枯病 軟腐病 斑点細菌病	1000倍	100~300L/10a	収穫開始7日前まで	2回以内	2回以内						
オクラ	葉枯細菌病			収穫21日前まで								
メキャベツ	黒腐病	1000倍	200~400L/10a	収穫7日前まで	1回	1回						
茶	輪斑病 赤焼病 新梢枯死症(輪斑細菌による) 褐色円星病 炭疽病			摘採30日前まで								
ばら	うどんこ病	1000倍	100~300L/10a	発病初期	6回以内	6回以内						
ほおずき	軟腐病 斑点細菌病											
ゆり	軟腐病	1000倍	100~300L/10a	収穫10日前まで	2回以内	2回以内						
たばこ	疫病											

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
●使用後の空袋は圃場等に放置せず、環境に影響のないよう、適切に処理してください。●防除日誌を記帳しましょう。