

2020年
7月14日
適用拡大!

新規殺菌剤

ケンシヤ[®]

フロアブル

果樹・野菜で使用できる作物が増えました

*印は本剤およびイソフェタミドを含む農薬の総使用回数

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	10アール当り 使用液量	使用時期	使用方法	総使用回数*
もも	灰星病	2,000	200~700 ℓ	収穫前日まで	散布	3回以内
おうとう						
うめ						
かき	灰色かび病、うどんこ病、落葉病	1,500	100~300 ℓ	収穫14日前まで		2回以内
かんきつ	灰色かび病、黒点病、そうか病					
ぶどう	黒とう病、灰色かび病 褐斑病、うどんこ病					
豆類 (種実、ただし、 いんげんまめ、 らっかせいを除く)	菌核病、灰色かび病	1,000~1,500	100~300 ℓ	収穫14日前まで	4回以内	
いんげんまめ	炭疽病					
さやえんどう	灰色かび病					
たまねぎ	菌核病、灰色かび病	1,500	100~300 ℓ	収穫3日前まで	3回以内	
きゅうり	褐斑病、うどんこ病、つる枯病					
いちご	灰色かび病					
メロン	うどんこ病、つる枯病	1,500	100~300 ℓ	収穫前日まで	3回以内	
トマト ミニトマト	葉かび病、灰色かび病、うどんこ病					
なす	菌核病、灰色かび病、うどんこ病					
キャベツ	菌核病	1,500	100~300 ℓ	収穫前日まで	3回以内	
レタス	菌核病、灰色かび病					
非結球レタス				収穫14日前まで		

※詳しくは弊社ホームページをご覧ください。



石原バイオサイエンス株式会社

〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目10番2号