



だから、  
収量に差がつく。<sup>\*2</sup>



速く効く。  
あの害虫にも効く。<sup>\*1</sup>

**対象害虫の  
幅広さ**

チョウ目害虫や  
アザミウマなど  
幅広い害虫<sup>\*1</sup>に効く。

**効きの速さ**

有効成分が直接  
害虫に作用するから、  
作物が食べられる前に  
駆除できる。

さらに多くの害虫に使えるようになった!

野菜・  
茶用  
殺虫剤

# グレーシア<sup>®</sup> 乳剤



- 有効成分フルキサメタミド配合。抵抗性コナガにも卓効
- 葉内に薬剤が浸透、葉裏の害虫も退治
- 幅広いチョウ目害虫に効果
- 殺虫効果は約2週間持続



\*1 作物によって通用害虫は異なります。詳しくは裏面をご覧下さい。  
\*2 効果は害虫の発生密度や天候、栽培環境等によって異なる場合があります。

# 速く効く。あの害虫にも効く。 グレーシア<sup>®</sup> 乳剤

農林水産省登録 第24185号 有効成分 フルキサメタミド…10.0% 人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称） 容量：250ml入、500ml入

グレーシアは、「効きの速さ」と「対象害虫の幅広さ」を兼ね備えた野菜・茶用殺虫剤です。

■ 速く効くから、収量に差がつかます。

POINT

01

効きの速さ

有効成分が直接害虫に作用するから、作物が食べられる前\*に駆除できる。

\*グレーシアの速効性については、右の試験写真をご覧ください。

POINT

02

対象害虫の幅広さ

チョウ目害虫やアザミウマなど幅広い害虫\*に卓効。

\*作物によって適用害虫は異なります。詳しくは下の表をご覧ください。



2018年 日産化学生物科学研究所（社内試験）【試験方法】虫体浸漬、処理1時間後餌入、20時間後撮影

## 適用害虫と使用方法

\*本剤及びフルキサメタミドを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量 (l/10a)	使用時期	総使用回数*	使用方法					
さといも	ハスモンヨトウ	2000~3000倍	100~300L	収穫7日前まで	2回以内	散布					
かんしょ	ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ、コナジラミ類、ハダニ類										
だいこん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ、キスジノミハムシ										
はくさい	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、オオタバコガ、ネギアザミウマ										
キャベツ	コナガ、アオムシ、ウフバ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、アザミウマ類、ハイマダラノメイガ										
カリフラワー	コナガ、アオムシ、ネギアザミウマ、ハスモンヨトウ										
ブロッコリー	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ウフバ類、オオタバコガ、ハイマダラノメイガ、ネギアザミウマ										
レタス、非結球レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ナモグリバエ、アザミウマ類										
たまねぎ	ネギアザミウマ										
ねぎ	ネギコガ、ネギハモグリバエ、シロイチモジトウ、アザミウマ類、クロバネキノコバエ類										
トマト、ミニトマト	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、コナジラミ類、アザミウマ類、トマトサビダニ、トマトハモグリバエ	2000倍	100~300L	収穫前日まで	2回以内	散布					
ピーマン	オオタバコガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、チャノホコリダニ										
なす	コナジラミ類、アザミウマ類、ハダニ類、チャノホコリダニ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、トマトハモグリバエ										
きゅうり	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、ハダニ類、コナジラミ類、トマトハモグリバエ										
すいか	オオタバコガ、ウリノメイガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、ハスモンヨトウ										
メロン	アザミウマ類、コナジラミ類、ウリノメイガ、ハダニ類										
だいず	マメシクワイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ウコンノメイガ、オオタバコガ、フタスジヒメハムシ						2000~3000倍	200~400L	収穫14日前まで	1回	
豆類（未成熟、ただし、えだまめを除く）	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類										
えだまめ	マメシクワイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ウコンノメイガ、オオタバコガ、フタスジヒメハムシ						2000倍	100~300L	発生初期	2回以内	
いちご	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハダニ類										
茶	チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメコバエ、マダラカサハラハムシ、ヨモギエダシヤク、チャノホソガ、チャトゲコナジラミ	2000~3000倍	-	植付前	1回	30分間種球浸漬					
	サビダニ類、チャノホコリダニ										
きく	ハスモンヨトウ、ハダニ類、オオタバコガ、アザミウマ類	2000倍	-	-	1回	-					
りんどう	リンドウホソハマキ、ハダニ類、アザミウマ類										
ゆり	ネダニ類	-	-	-	1回	30分間種球浸漬					

### 使用上の注意事項（抜粋）

- 天敵類に影響があるので使用に際しては注意してください。●水なす、賀茂なすの果実には薬害を生じるので、使用しないでください。
- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2020年8月現在の登録内容に基づいています。