

令和3年度 病害虫情報 第1号

中山間地において、アブラムシ類の発生に注意してください

1 現在までの発生状況

沼田市井土上町に設置した黄色粘着トラップへの有翅アブラムシ類の飛来数は、5月中旬頃から急増し、平年（7カ年平均）の飛来数を上回っています（図1）。中山間地のアブラムシ類の発生は平年より多いと考えられます。




図1 黄色粘着トラップへの有翅アブラムシ類の飛来数 沼田市井土上町

2 今後の発生傾向

- (1) 中山間地では例年6月末頃まで有翅アブラムシ類の飛来が多い状態が続きます。栽培中の作物や、これから定植する作物では、アブラムシ類の発生に注意してください。
- (2) 沼田市井土上町の他、県平坦地2地点（黄色水盤1、黄色粘着トラップ1）で飛来状況を調査しています。最新の情報は群馬県農業技術センターのホームページに掲載しています。

→ <https://www.pref.gunma.jp/07/p14210015.html>



病害虫発生予察情報
一覧はこちら

3 予想される被害と防除対策

- (1) 各作物で有翅アブラムシ類の吸汁による被害や、媒介する各種のウイルス病の発生が懸念されます。
- (2) ほ場をよく見回り、早期発見によりアブラムシ類の防除に努めてください。野菜・花き類のは種・定植時には殺虫剤を施用する等、初期防除に努めてください。
- (3) ほ場や育苗ハウス周辺の雑草はアブラムシ類の発生源となりやすいので、除草を行ってください。特に作付け作業前には必ず実施してください。
- (4) 農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている使用方法、注意事項等を確認して適正に使用してください。