

宮農経済トピック

No.679(2021.8.10)

今週のメニュー

- T A C通信
- 青果物の市場概況
- 病害虫発生予察情報（8月予報）
- 特殊穿孔技術から生まれた霧散水
『ミストエース20ハウスクール』について
- 定植前の灌注処理に！
殺虫剤「ベリマークSC」について
- 気象情報
- 実証農場情報
- J Aみどりの風

T A C通信（623号）

【本所】「野菜栽培概論講習会」の開催について（ご案内）

【本所】第2回T A Cアグリビジネススクール収録動画の格納について（ご案内）

詳細は別途資料をご覧ください

青果物の市場概況

			7月24日	～	7月31日	8月1日	～	8月7日
品 名			高値		安値	高値		安値
ほうれん草	（200g）	袋	140	～	32	140	～	32
キャベツ	（10kg）	DB	1,080	～	432	1,080	～	432
だいこん	（10kg）	DB	1,080	～	432	1,080	～	432
オクラ	（100g）	ネット	—	～	—	65	～	43
なす	（400g）	袋	140	～	65	140	～	65
トマト	（4kg）	DB	1,080	～	324	1,080	～	324
はくさい	（12kg）	DB	324	～	108	432	～	216
ミョウガ	（50g）	パック	—	～	—	130	～	86
えだまめ	（250g）	袋	238	～	108	238	～	108
とうもろこし	（5kg）	DB	1,134	～	324	1,080	～	324

病虫害発生予察情報（８月予報）

群馬県農業技術センター作成の病虫害発生予察情報（８月予報）をご紹介します。

主な病虫害の発生予報

作物名	病虫害名	発生量
イネ	紋枯病・斑点米カメムシ類	やや多
果樹類全般	ハダニ類	やや多
野菜類・花き類	オオタバコガ	やや多
レタス	腐敗病・軟腐病	やや多

関東甲信地方の天候見通し

＜向こう１か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率（％）＞

要素	地域	低い（少ない）	平年並	高い（多い）
気温	関東甲信地方	１０	３０	６０
降水量	関東甲信地方	３０	３０	４０
日照時間	関東甲信地方	４０	３０	３０

詳細は別途資料をご覧ください

特殊穿孔技術から生まれた霧散水『ミストエース20ハウスクール』について

特殊穿孔技術から生まれた霧散水『ミストエース20ハウスクール』についてご紹介いたします。

特殊穿孔による霧散水が空中湿度を保持。冷房効果も発揮し、育成に貢献。

ハウス内の頭上に吊り下げてお使いいただく灌水チューブです。

専用の部材「ミストエース20用ハンガー」をハウス内に設置することで簡単に吊り下げることができます。

住化独自の特殊穿孔で微細な霧散水を実現しました。

やさしい霧状の散水で気化熱を利用したハウス内の冷房、ハウス内の湿度保持の目的としてご利用できます。

【特徴・効果】

- ・「ミストエース20用ハンガー」をエスター線や針金に1 m以内の間隔で設置し、そのハンガーにミストエース20ハウスクールを設置します。
- ・特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。

詳細は別途資料をご覧ください

お問い合わせ先

園芸部 園芸資材課

T E L : 0 2 7 - 2 2 0 - 2 2 9 1

定植前の灌注処理に！殺虫剤「ベリマークSC」について

殺虫剤「ベリマークSC」についてご紹介いたします。

灌注処理することで害虫の初期防除を省力化することができます。

秋冬野菜の定植前に是非ご活用ください。

【特徴】

- そしゃく性害虫（チョウ目、ハエ目、コウチュウ目）と吸汁性害虫（カメムシ目、アザミウマ目）等の広範囲な害虫に卓効を示します。
- 主に害虫の摂食により薬剤が取り込まれ、速やかに摂食活動を停止させます。
- チョウ目害虫の令期が進んだ幼虫に高い効果を示します。
- 灌注処理すると薬剤は作物の根から吸収され、導管を通して地上部に移行し、処理後約3～4週間の残効を示します。
- 灌注処理により天敵、訪花昆虫への安全性がより高くなり、IPMプログラムに取り込むことが可能です。

【ベストな灌注処理のタイミング】

- ・果菜類…定植の5～7日前の薬剤処理
- ・葉菜類…定植の3～5日前の薬剤処理

使用する際はラベルを確認し、最新の登録内容に従ってください。




詳細は別途資料をご覧ください


お問い合わせ先

生産資材部 肥料農薬課


TEL：027-220-2301




年間降水量（mm）



年間平均気温（℃）




年間日照時間（h）







年間降水量 (mm)



年間平均気温 (°C)




年間日照時間 (h)







年間降水量 (mm)



年間平均気温 (°C)




年間日照時間 (h)







年間降水量（mm）



年間平均気温（℃）



年間日照時間（h）



実証農場情報

キュウリ・ナスをはじめとした施設野菜の栽培状況やGAPへの取り組みなど、園芸作物生産実証農場の今をご紹介します。

■ハウスナス（定植：2/5 剪定：7/27）
「あのみり2号」「とげなし輝楽」「TNA-168」
「式部」「黒福」

■抑制キュウリ（定植：8/17予定）※ういずone含む

J A みどりの風

旬の美味しい野菜や果物をご紹介します。新鮮で安心・安全な農産物を販売するJAの直売所、農家の奥さま直伝のレシピ等も必見！

群馬テレビで放送中！

■本放送
毎週月曜日 21:00～21:30
■再放送
毎週日曜日 8:00～8:30

令和3年度 促成キュウリ栽培について

面積：20a
定植：1/16
出荷期間：2/16～7/12
品種：ニーナZ
誘引方法：更新型吊る下ろし

単位：kg、%

出荷月	A		無印		AL	A2S	B	C	加工 (バラ)	花木 (バラ)	合計	前年 重量	前年比
	M	S	M	S									
2月	365	1,052	213	226	50	29	84	18	0	0	2,036	1,616	126.0%
3月	1,315	2,837	1,086	1,189	304	75	610	152	50	80	7,695	6,819	112.8%
4月	1,331	3,663	1,199	1,467	431	302	1,060	331	321	20	10,124	7,907	128.0%
5月	1,116	4,571	841	1,371	195	283	765	134	307	0	9,581	9,488	101.0%
6月	1,121	3,888	961	1,214	226	235	952	202	375	0	9,172	7,227	126.9%
7月	233	926	338	514	54	58	465	117	125	0	2,828	3,325	85.1%
合計	5,480	16,935	4,637	5,979	1,259	981	3,935	953	1,178	100	41,435	36,381	113.9%

8/9（月） 5年連続日本一！夏秋なすの魅力をリサーチ

J A 佐波伊勢崎管内から県内の中でも生産が盛んに行われている「夏秋なす」の魅力について特集します！ファーマーズマーケット「からか〜ぜ」で旬の農産物や、ナスを使った料理、J A 佐波伊勢崎のオリジナル商品も紹介します。

8/16（月） はるなくだもの街道

J A はぐくみ管内で果樹生産が盛んな高崎市榛名地区から旬のプラムや桃、梨の生産の様子をお届けします！
果樹園直営の直売所や管内で採れた桃を使った料理も紹介します。

J A 全農ぐんま 公式SNSのご紹介



酪農畜産課 生産振興課
@Jazennohgunnma @zennoh32seisan



酪農畜産課
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.rakunouchikusan/>
渋川家畜市場
<https://www.facebook.com/zennoh.gunma.shibukawa/>

フォロー・いいねをお願いします！



編集後記

台風の平年値について調べてみました。気象庁のホームページによると年間の台風発生数は25.1、接近数は11.7、上陸数は3.0だそうです。思ったより上陸する台風が少ないことに驚きました。
※次回配信は8/23となります。

営農経済トピックは、各部署等からの情報をまとめ、毎週月曜日に発信しています。
情報内容へのご意見・ご要望をおまちしております。
園芸部 生産振興課
TEL：027-220-2046