

# 健康的な作物つくりのために

## 液体けい酸カリ肥料

# はつらつKさん

規格  
5kgポリタンク×4

### △すぐにケイ酸を補給！

この肥料のけい酸成分は水溶性なので、作物に無駄なく、すばやく吸収されます。また、速効性のカリ成分も含みますので、カリの補給も同時にできます。

### △根の張りを良くします！

けい酸は、根の活性を高め、作物の健全な生育を促進します。また、光合成を高く維持し、作物の糖度を高め、鮮度保持効果も期待できます。

### △作物を丈夫に パワフルに！

イチゴ・ウリ類などでは、けい酸の施用により病原菌に対する抵抗性が高まることが、学術研究などで報告されています。

(けい酸の吸収により植物体の表皮組織を強化し、病原菌の侵入を阻止したり、抵抗性物質の誘導があることなど)

### <保証成分%>

水溶性カリ	水溶性ケイ酸
9	19



## <使用方法>

①はつらつKさんを所定量の水に溶かして、灌水施用または動力噴霧器施用してください。

②使用基準量は概ね下記のとおりです。

作物	使用方法	
イチゴ	灌水施肥	定植後3ヶ月までに、2回／月を目安に。 1回当たり2~2.5kg/10a (定植2週間以降)
	葉面散布	500~1,000倍希釈し、200L/10aを散布。 (定植1ヶ月以降)
ウリ類 (キュウリ メロン スイカ)	灌水施肥	定植後1ヶ月までに、2回／月を目安に。 1回当たり2~2.5kg/10a (定植2週間以降)
	葉面散布	500~1,000倍希釈し、200L/10aを散布。 (定植1ヶ月以降)

## <使用上の注意>

① 本剤は強アルカリ性です。使用時は保護具(ゴーグル、マスク、手袋)を着用し、皮膚への接触を避けてください。特に眼に入らないようにご注意ください。

万一眼に入ったら直ちに流水で洗い、医師の診断を受けてください。

衣服や皮膚についた場合は速やかに水で洗い流してください。

② 本剤は飲みものではありません。誤って飲み込んだ場合は大量の牛乳または水を飲み直ちに医師の診断を受けてください。

③ 他の物質(液肥、農薬、展着剤)との混合使用は避けてください。

また、塩分、肥料分を含む水には混用できません(分離が発生することがあります。事前に少量を混合して確認してください)。

④ 使用器具は、使用前と使用後によく洗ってお使いください。

⑤ 障害発生の可能性があるので、高温時の葉面散布は避けてください。

⑥ 使用上の注意を遵守してください。

⑦ この肥料の利用方法に不明な点がありましたら、最寄のJAにご相談ください。

## <使用上の注意>

① 幼児等の手の届かない場所に保管してください。

② キャップを閉めて保管してください。

③ 直射日光の当たる場所や、高温多湿の場所を避けて保管してください。