

# ほうれんそうの アブラムシ類、 ホウレンソウ ケナガコナダニを 同時防除!



## モベント<sup>®</sup> フロアブル

ホウレンソウ  
ケナガコナダニ  
に登録拡大  
しました!



アブラムシ類




ホウレンソウケナガコナダニ  
の被害

新規系統の薬剤で、  
アブラムシ類、  
ホウレンソウケナガコナダニに  
優れた効果を  
示します。

優れた浸透移行性を有し、  
薬液が直接かからない新芽に  
隠れた害虫にも効果を発揮します。  
また、散布後、新葉にも有効成分が行き渡ること  
で、長い残効を示します。

### 優れた浸透移行性



- モベント<sup>®</sup>フロアブルは従来の導管移行性殺虫剤と異なり、有効成分が導管と篩管の2つのルートを利用して植物体内を上下双方向に移動します。
- 新芽にも有効成分が移行することで、吸汁性害虫から新芽を守ります。

濃度高 ← 濃度低

○印の場所に菜種油メチルエステル0.1%とともに5 $\mu$ lの<sup>14</sup>Cで標識した有効成分スピロテトラマトを滴下し、2日後の有効成分の移行を調査した。

詳しくは  
こちらから!





## X 適用害虫および使用方法 (一部抜粋)

2021年7月現在の登録内容

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数	使用方法
ほうれんそう	アブラムシ類 ホウレンソウケナガコナダニ	2,000	100~300ℓ /10a	収穫 14日前まで	3回以内	3回以内	散布

●その他の適用作物、適用害虫等は製品ラベルをご確認下さい。

## X 効果



## ホウレンソウケナガコナダニへの上手な使い方

被害発生圃場では、本葉2葉期と4葉期頃に薬液を十分量散布して下さい。

未熟堆肥の施用を避け、植物残渣を処理して下さい。また多発圃場では土壌くん蒸剤や土壌処理剤等との体系防除で本剤をご使用下さい。

## X 混用事例

殺虫剤				殺菌剤	
アグロスリン乳剤	エルサン乳剤	スミチオン乳剤	フローバックDF	Zボルドー	ヨネボン水和剤
アディオン乳剤	カスケード乳剤	ゼンターリ顆粒水和剤	マラソン乳剤	アリエッティ水和剤	ライメイフロアブル
アドマイヤー顆粒水和剤	コテツフロアブル	ノーモルト乳剤	モスピラン顆粒水溶剤	コサイド3000	ランマンフロアブル
アドマイヤーフロアブル	ジェイエース水溶剤	パダンSG水溶剤	ランネット45DF	ドイツボルドーA	レーバフロアブル
アフーム乳剤	スピノエース顆粒水和剤	プレバソンフロアブル5		ピシロックフロアブル	

上記薬剤は、モベント®フロアブルとの散布での混用によって、薬害が認められなかった事例です。なお、気象条件、栽培条件、生育ステージ、品種などにより異なった結果が得られることも予想されます。上記事例は、使用の安全性を保証するものではなく、あくまでも参考事例としてお取り扱い下さい。

## X 注意事項

- 使用前によく振ってから使用して下さい。
- やなぎに対しては薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意して下さい。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、周辺の桑葉にかからないようにして下さい。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 最高分げつ期から出穂開花期の稲に本剤がかかると不稔などの薬害を生じる場合があるので、かからないように注意して下さい。
- 誤飲などのないよう注意して下さい。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせて下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けて下さい。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合には直ちに水洗して下さい。
- 使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに衣服を交換して下さい。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯して下さい。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意して下さい。
- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管して下さい。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://crops.cscience.bayer.jp/>

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00~12:00,13:00~17:00  
土日祝日および会社休日を除く