



おすすめ品種紹介 第56回

全農 営農情報・システム推進室では、生産者にあらためて定番としておすすめしたい品種・新定番となりうる品種について、種苗会社アンケートを実施いたしました。毎号、担い手生産者向けのおすすめ品種を品目ごとにご紹介いたします。

変わった野菜

今号は、葉物西洋野菜の変わった品種について紹介します。今回の品種は、タデ科、シソ科、セリ科、キク科、ヒガンバナ科、アブラナ科の野菜で種類が異なることから、色合い、味、風味が異なります。そこで、これらすべての品種の若葉を混ぜてサラダに利用するベビーリーフがおすすめです。バジルは花が咲く前が収穫のベストタイミング。どれもこまめに収穫ほど多彩な味わいを長く楽しめます。

葉の枚数が多くシャキシャキ食感



リーフレタス **ナバロン** PVP
 品種名: NAVARONE 海外持出禁止 (農林水産大臣公示有)
 ヴィルモランみかど(株)

葉の枚数が多く、大きさがよく揃う、バタビアタイプのリーフレタス。葉は明るいライムグリーンで、シャキシャキとした食感が特徴。草丈はコンパクトで扱いやすい。抽だいは比較的遅く、幅広い作型で栽培できる。

栽培のポイント

土質を選ばず、広く栽培しやすい品種。夏季でも草丈は比較的伸びにくく、幅広く栽培でき、露地でも水耕栽培でもよく育つ。作型は広く、適温での播種、栽培地に合わせた栽培がおすすめ。

耐病性に優れたグリーン系交配品種



セロリ **ミツバリアン**
 (株)サカタのタネ

茎は鮮やかな薄緑色で、葉は光沢のある緑色。極立性で密植栽培にも適する。葉の病気に強く、栽培管理が容易。わき芽が少なく、収穫や加工時にロスが少ない。発芽性が高く、生育が安定している。繊維が強くなく、食感がよい。

栽培のポイント

発芽適温は18~20℃で、好光性種子。25℃以上で急激に抑制されるため、30℃にならないよう調整する。生育温度は15~22℃が適している。生育は、25℃以上になると抑えられ、30℃以上で葉色が褪せて滞る。

品種	作型	地域	1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
ナバロン	露地(夏秋どり)	寒冷地							○	▼			■	■	■	○	▼	■	■	■						
	露地(春どり/秋どり)	一般地			○		▼	○		■	■	■					○	▼	○		■	■	■	■	■	■
	トンネル(冬春どり)	暖地	■	■	■	○	▼	■	■	■										○	▼			■	■	■
	水耕栽培				○				■	■	■	■	■	■	■	■	○	▼	■	■	■	■	■	■	■	■
ミツバリアン	寒地	寒冷地					○	▼					○	▼	■	■	■	■	■	■						
	温暖地				○		▼		○	▼	■	■	▼	○	▼	○	▼	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	暖地		■	■	○		▼		○	▼	■	■	▼	○	▼	○	▼	○	▼	■	■	■	■	■	■	■
なつもみじ	春どり	一般地						○	▼	■	■															
	夏どり												○	▼	■											
	秋どり																			○	▼	■				

○：播種 ▼：定植 ■：収穫 ■：トンネル

●問い合わせ先 ヴィルモランみかど(株) 国内カスタマーサービス TEL.043-311-6100 (株)サカタのタネ お客様相談室 TEL.0570-00-8716 山陽種苗(株) 種苗部 TEL.079-223-3441

高温期でも鮮やかな赤色からしな



からしな **なつもみじ** PVP
 品種名: SM2012 海外持出禁止 (農林水産大臣公示)
 山陽種苗株

みずなのような葉形の赤からしな。高温期の栽培でも鮮やかな赤い発色が特徴。ほどよい辛味があり、漬物やおひたし、サラダのほか、カット野菜の辛味食材として

も最適。露地、ハウス栽培や水耕栽培に適する。

栽培のポイント

生育はじっくり型なので、低温期の栽培は避ける。サラダ用は20cm程度で収穫し、漬物・おひたし用は25cmで収穫するのが最適。採り遅れると葉が硬くなるので注意する。

爽やかな酸味、鮮やかなグリーンにレッドライン



ベビーリーフ **レッドソレル (オゼイユ)**
 中原種苗株

和名「スイバ」と呼ばれるタデ科の多年草。吸肥力が強く生育旺盛だが、高温期は生育が停滞し、とう立ちしやすい。丸葉で葉肉は

厚く、爽やかな酸味がある。鮮やかなグリーンにレッドの葉脈が特徴的で、サラダや付け合わせのアクセントに利用できる。

栽培のポイント

発芽適温は18~23℃。高温期の播種は発芽率の低下につながる。生育適温は15~25℃。冷涼な気候と湿度のある土壌を好む。乾燥は避け、適宜かん水に努める。ベビーリーフとしては、草丈10~15cmが収穫の目安。

短稈系ジェノベーゼタイプ



バジル **TSGI-207**
 トキタ種苗株

短節間で分枝が多く、高収量。香りのバランスがよい。短稈を活かし、植物工場での栽培や鉢苗としても使用しやすい。べと病に非常に強く、

高温にも強く、真夏のハウス栽培でも葉先枯れが少ない。

栽培のポイント

播種時の覆土が厚いと発芽しないことがあるので注意する。摘芯し枝数を増やす。昼と夜の温度差が大きく、湿度が高いと、べと病が発生しやすい。強い品種を利用しつつ総合的な防除を心がける。

旨さあふれる西洋ねぎリーキ



リーキ **メガトン**
 丸種株

ねぎの仲間でもポロネギ、ポワロネギと呼ばれている。加熱料理で旨味がとけ出し、抜群の美味しさ。煮る、焼く、炒める、揚げるなど

楽しみ方は多様。見た目の新規性に味のよさも加わっておすすめの品目。

栽培のポイント

植え溝をつくって苗を定植する。生育とともに数回にわたり土寄せ・追肥・除草を行い、白根の部分伸ばす。極端な乾燥には弱いので留意する。育苗は60日程度かかるので、その期間の肥料切れには注意する。

品種	作型	地域	1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月			
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中
TSGI-207		一般地							○		▼		■	■	■	■	■	■	■	■								
レッドソレル (オゼイユ)	周年	ハウス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	春・秋まき	一般地																										
メガトン	年内どり	寒冷地																										
	年内~1月どり	一般地	■	■	■																							
	年内~3月どり	暖地	■	■	■	■	■	■	■	○																		

○: 播種 ▼: 定植 ■: 収穫