



営農NEWS



大雨により浸冠水したキャベツ、ブロッコリー、レタス、ハクサイなどの被害対策

台風 17 号および 18 号の影響による大雨は、9 月 10 日には茨城県にも「特別警報（大雨）」が発表され、県西を中心として秋の露地野菜畑が浸冠水を受けています。

今後、浸冠水による悪影響を出来るだけ回避するために、下記の対策に努めてください。

- 大雨で浸冠水した畑は、早急に過剰な水分の除去と地下水位を下げるため、圃場周囲や圃場内に一定間隔で明渠を作るなど、圃場排水を促します。また、作物に付着した泥はできるだけ落とし、損傷した茎葉を可能な限り取り除きましょう。浸冠水した圃場の作物は、土壌病害や茎葉病害が発生しやすくなりますので必要に応じて殺菌剤の散布を行い、病害防除に努めてください。さらに、土壌の乾き具合や作物の草勢を観察しながら、必要に応じて追肥や液肥の葉面散布などを実施してください。

- 薬剤防除を実施しましょう。下記は、平成 27 年 9 月 10 日現在で、各作物の対象病害 薬剤名 希釈倍数（収穫前日数／使用回数）を表記しました。

- キャベツ：軟腐病・黒斑細菌病… スターナ水和剤 1,000 倍（7 日前／3 回）
軟腐病・黒腐病・黒斑細菌病… カセット水和剤 1,000 倍（7 日前／3 回） カスミンボルドー 1,000 倍（7 日前／4 回）
株腐病・黒腐病・軟腐病… バリダシン液剤 5 800 倍（7 前日／5 回）
菌核病・株腐病… アフェットフロアブル 2,000 倍（前日／3 回）
- ブロッコリー：べと病… ランマンフロアブル 2,000 倍（3 日前／3 回）
軟腐病・黒斑細菌病… スターナ水和剤 2,000 倍（14 日前／2 回）
- レタス：軟腐病・腐敗病… スターナ水和剤 2,000 倍（7 日前／2 回） カセット水和剤 1,000 倍（7 日前／2 回）
腐敗病・斑点細菌病… カスミンボルドー 1,000 倍（7 日前／4 回）
菌核病… ファンタジスタ顆粒水和剤 2,000～3,000 倍（3 日前／3 回）
- 非結球レタス：腐敗病… カスミンボルドー 1,000 倍（21 日前／4 回） Zボルドー 500～800 倍（－／－）
- ハクサイ：軟腐病… スターナ水和剤 1,000 倍（7 日前／3 回） ソータルWDG 1,000 倍（14 日前／3 回）
- カリフラワー：べと病… ダコニール 1000 1,000 倍（出蕾前・14 日前／3 回）
軟腐病… スターナ水和剤 2,000 倍（14 日前／2 回）
- ダイコン：軟腐病・黒斑細菌病… カスミンボルドー 1,000 倍（14 日前／3 回）
カセット水和剤 1,000 倍（14 日前／3 回）
- ネギ：黒斑病・べと病… ダコニール 1000 1,000 倍（14 日前／3 回）
ジマンダイセン水和剤 600 倍（14 日前／3 回）
- 野菜類（共通）：軟腐病・黒腐病・斑点細菌病・べと病… Zボルドー 500 倍（－／－）

- 生育回復の対策（葉面散布剤の使用法）

＜葉菜類や根菜類＞

- メリット青 300～500 倍＋グリーンセーフ S 1,000 倍を、3～5 日おきに 2 回程度の葉面散布を行います。 または
- ファイトオーツー 1,000 倍＋ファイトマジック 1,000 倍を、5～7 日おきに 2～3 回の葉面散布を行います。

＜果菜類＞

- メリット青またはメリット黄 300～500 倍＋グリーンセーフ S 1,000 倍を、3～5 日おきに 2 回程度の葉面散布を行います。 ※ 青・黄は生育に応じて使い分けてください。

農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。



生産資材部 営農企画課

電話：029-291-1012 FAX：029-291-1040