



営農NEWS



秋冬どりキャベツの病害防除を徹底しましょう

大雨や長雨で、県西部を中心に、生育中の作物に浸冠水の被害が発生しました。特に、キャベツは生育初～中期に入っており、圃場の土壌環境が過湿状態になりますと、土壌病害の軟腐病や株腐病、茎葉病害の黒腐病や黒斑細菌病、菌核病、べと病等が発生しやすくなります。これらの病害は、発病環境が好適になり、多発生すると防除が困難となって、甚大な被害となってしまいます。

今後の気象 1 カ月予報（9 月 17 日発表）によりますと、「天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込み」と予想されており、病害の発生を助長する条件となっています。

このため、今後は、圃場での病害虫発生状況をよく観察し、発病が確認されたら早急な薬剤防除に努めてください。

＜圃場湿害対策のポイント＞

大雨や長雨で浸冠水する畑は、過剰な水分の除去と地下水位を下げるため、圃場の周囲や圃場内に一定間隔で排水溝を作るなど、圃場排水を促します。

浸冠水をうけた圃場の作物は、土壌病害や茎葉病害が発生しやすくなりますので、必要に応じて殺菌剤の散布を行い、病害防除に努めます。また、土壌の乾き具合を見ながら中耕、培土を行って発根を促し、草勢の回復を図ります。さらに、作物の草勢を観察しながら、必要に応じて追肥や液肥の葉面散布などを実施してください。

表 1 キャベツ 黒腐病、黒斑細菌病、軟腐病の主な防除薬剤（平成 27 年 9 月 17 日現在）

対象病害			薬 剤 名	希釈倍率	使用時期 / 使用回数	その他の対象病害
黒腐病	黒斑細菌病	軟腐病				
	○	○	スターナ水和剤	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 3 回以内	
○	○	○	カセット水和剤	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 3 回以内	
○	○	○	カスミンボルドー	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 4 回以内	
○		○	バリダシン液剤 5	800 倍	収穫 7 日前まで / 5 回以内	株腐病
○	○		アグリマイシン-100	2,000 倍	収穫 14 日前まで / 2 回以内	
○			キノンドーフロアブル	800~1,000 倍	収穫 14 日前まで / 3 回以内	
○	○	○	Zボルドー	500 倍	-/-	べと病

表 2 キャベツ 菌核病、株腐病の主な防除薬剤（平成 27 年 9 月 17 日現在）

対象病害		薬 剤 名	希釈倍率	使用時期 / 使用回数	その他の対象病害
菌核病	株腐病				
○	○	セイビアーフロアブル 20	1,000 倍	収穫 3 日前まで / 3 回以内	
○	○	シグナムWDG	1,500 倍	収穫 7 日前まで / 2 回以内	べと病
○	○	アフエットフロアブル	2,000 倍	収穫前日まで / 3 回以内	根朽病
○		ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000~3,000 倍	収穫 14 日前まで / 3 回以内	
○		ロブラール水和剤	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 4 回以内	
○		トップジンM水和剤	1,000~1,500 倍	収穫 3 日前まで / 2 回以内	
	○	リゾレックス水和剤	500~1,000 倍	収穫 7 日前まで / 3 回以内	
	○	ソタールWDG	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 3 回以内	軟腐病

表 3 キャベツ ベと病の主な防除薬剤（平成 27 年 9 月 17 日現在）

薬 剤 名	希釈倍率	使用時期 / 使用回数	その他の対象病害
ランマンフロアブル	2,000 倍	収穫 3 日前まで / 4 回以内	
プロポーズ顆粒水和剤	1,000 倍	収穫 14 日前まで / 2 回以内	
ダコニール 1000	1,000 倍	収穫 14 日前まで / 2 回以内	根朽病
フェスティバル水和剤	2,000 倍	収穫前日まで / 3 回以内	
Zボルドー	500 倍	-/-	黒腐病、軟腐病など

農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。



生産資材部 営農企画課

電話：029-291-1012 FAX：029-291-1040