



営農NEWS



突然の降雹や突風等被害への対応について

6月16日の午後4時過ぎ頃から、突発的に大雨を伴う降雹突風等が県内の一部で発生しました。農作物への被害が見受けられた場合は、生育の回復や被害軽減を図るために、下記を参考に必要に応じて対策に努めてください。

1 被害を受けた圃場の対策

- 1) 露地圃場または施設内が浸水及び冠水した場合は、速やかな排水対策を行って圃場の乾燥を促しましょう。
- 2) 作物に付着した泥はできるだけ落とし、損傷した茎葉は可能な限り取り除きましょう。
- 3) 土壌の乾き具合や作物の草勢を観察しながら、液肥の葉面散布や追肥しての中耕、培土などを行きましょう。
- 4) 露地野菜などが風にあおられたり、大雨にたたかれたりすると病害発生の原因になりますので、状況を見ながら殺菌剤などの予防散布に努めましょう。

2 病害の予防対策

- 1) 加工トマト：斑点細菌病 … カスミンボルドー 1,000 (前日/5回)
疫病 … カーゼートPZ水和剤 1,000~1,500倍 (前日/2回)、ダコニール1000 1,000倍 (前日/4回)
- 2) ナス：褐色腐敗病 … ランマンフロアブル 2,000倍 (前日/4回)、プロポーズ顆粒水和剤 1,000倍 (前日/4回)
すすかび病 … ダコニール1000 1000倍 (前日/4回)、ベルコートフロアブル 2,000倍 (前日/3回)
- 3) ネギ：軟腐病 … スターナ水和剤 2,000倍 (7日前/3回)、カスミンボルドー 1,000倍 (14日前/2回)
黒斑病・べと病 … ダコニール1000 1,000倍 (14日前/3回)
- 4) カボチャ：べと病 … プロポーズ顆粒水和剤 1,000倍 (7日前/3回)、ダコニール1000 1,000倍 (7日前/3回)、
オーソサイド水和剤80 600倍 (14日前/5回)
疫病 … フェスティバルC水和剤 1,000倍 (3日前/3回)、ベフドー水和剤 500倍 (7日前/4回)
褐斑細菌病 … Zボルドー 500倍 (—/—)
- 5) ゴボウ：黒斑細菌病 … カスミンボルドー 1,000倍 (14日前/3回)、Zボルドー 500倍 (—/—)
- 6) サヤインゲン：灰色かび病 … セイビアーフロアブル20 1,000~1,500倍 (前日/3回)
- 7) サヤエンドウ：褐斑病 … トップジンM水和剤 2,000倍 (前日/3回)
灰色かび病 … セイビアーフロアブル20 1,000倍 (前日/3回)
- 8) ダイコン：軟腐病・黒斑細菌病 … カスミンボルドー 1,000倍 (14日前/3回)、
カセット水和剤 1,000倍 (14日前/3回)、Zボルドー 500倍 (—/—)
- 9) 未成熟トウモロコシ：紋枯病 … リゾレックス水和剤 1,500倍 (14日前/2回)
すす紋病 … トリフミン水和剤 2,000倍~4,000倍 (7日前/3回)
- 10) 野菜類：軟腐病・黒腐病・斑点細菌病・べと病 … Zボルドー 500倍 (—/—)
- 11) 果樹(ナシ、ブドウ、カキ、リンゴなど)：参考防除例を参照して、予防に努めてください。

3 作物生育の回復対策

◆風雨によって作物が被害を受けた際には、草樹勢の回復を目的に葉面散布または土壌かん注を実施してください。

<葉面散布>

◎アミノメリット青または黄 300~500倍を3日おきに2回程度の葉面散布をします。

⇒ 暴風雨により弱った作物を活性化します

*青・黄色は生育に応じて使い分けてください。

<果菜類への土壌かん注またはかん水>

◎アミノキッポ500倍またはチャンス液S 300倍の加用で、2週間おきに1~2回を目安に実施します。

⇒ 根の活性を促します

農薬使用の際には、ラベルに記載の登録内容、使用法、注意事項などを確認し、周辺の飛散に注意下さい。

※JA全農いばらきホームページでもご覧になれます。



生産資材部 営農企画課

電話：029-291-1012 FAX：029-291-1040