



営農NEWS



水稻の斑点米カメムシ類の防除を徹底しましょう

県内における水稻の品質低下（等級落ち）の主な原因としては、乳白米など障害粒の発生とカメムシ類による斑点米の混入です。これらはいずれも高温の年に、発生しやすい傾向にあります。

病虫害発生予報 7 月号によりますと、斑点米カメムシ類の発生時期は平年並、発生量も平年並と予想されています。

本県の斑点米カメムシの主要種はクモヘリカメムシで、その他、イネカメムシ、ホソハリカメムシ、アカスジカスミカメ、アカヒゲホソミドリカスミカメなどが関与すると考えられています。

なお、水稻「コシヒカリ」の出穂時期は、農業研究所の「農研速報」によりますと、水田利用研究室（龍ヶ崎市：6 月 27 日調査）の 4 月 27 日移植で 7 月 25 日頃、作物研究室（水戸市：7 月 10 日調査）の 5 月 1 日移植で 7 月 27 日頃、5 月 10 日移植で 7 月 31 日頃と、ほぼ平年並みの予想となっています。また、「あきたこまち」では既に、ほぼ平年並の 7 月中旬を中心に出穂しています。

圃場の出穂期をよく確認しておき、出穂後の下記の防除適期に斑点米カメムシ類の防除を必ず実施してください。

なお、水田内のカメムシ類の生息を確認する場合は、日中の高温時は避けて、夕方や早朝など涼しい時間帯に水稻の穂などを注意深く観察してください。

<薬剤防除のポイント>

1. 本田に侵入したカメムシ類の成虫を対象とした場合、防除適期は穂揃期です。
2. 斑点米カメムシの幼虫を対象とした場合、防除適期は出穂 10～15 日後頃です。斑点米を抑制するためには、とくに新幼虫を対象とした防除が最も重要です。

なお、その後はカメムシ類の発生を観察しながら、必要に応じて追加防除を行いましょう。

3. 出穂が周辺よりも早い水田、ヒエ等の雑草が多発している水田では、成虫の飛来が集中しやすい傾向があります。また、出穂の遅い水田では、周辺の水田で増殖した新成虫が侵入してくることがあります。これらの水田では特に十分な注意が必要です。
4. 防除を行う際には、収穫前日数などの農業使用基準に十分に注意してください。また、ミツバチへの被害を軽減するために、ミツバチの活動が最も盛んな時間帯（午前 8 時～12 時まで）の農薬散布は避けてください。

表 2 水稻 カメムシ類の主な防除薬剤（平成 29 年 7 月 19 日現在）

薬 剤 名	希 釈 倍 数	使用時期 / 使用回数
MR. ジョーカー EW	2,000 倍	収穫 14 日前まで / 2 回以内
MR. ジョーカー粉剤 DL	3～4 kg	収穫 7 日前まで / 2 回以内
スタークル顆粒水溶剤	2,000 倍	収穫 7 日前まで / 3 回以内
スタークル粉剤 DL	3 kg	収穫 7 日前まで / 3 回以内
キラップフロアブル	1,000～2,000 倍	収穫 14 日前まで / 2 回以内
キラップ粉剤 DL	3～4 kg	収穫 14 日前まで / 2 回以内
スミチオン乳剤	1,000 倍	収穫 21 日前まで / 2 回以内
スミチオン粉剤 3 DL	3～4 kg	収穫 21 日前まで / 2 回(出穂前は 1 回)以内

注) 1. 各薬剤の液剤または粉剤の、いずれかを使用してください。

2. 専用の少量散布用ノズルを装着した乗用型の地上液剤散布機器を用いる場合や、無人ヘリコプターを使用する場合には、それぞれの農業使用基準を遵守して使用してください。

農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。

※ JA 全農いばらきホームページでもご覧になれます。



JA 全農いばらき

生産資材部 営農企画課

電話：029-291-1012 FAX：029-291-1040